

**Karamat™**  
2,5EW  
ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ




**Dow AgroSciences**

*Solutions for the Growing World*






Fenbuconazole: 2,5% β/ο




Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση. Ανήκει στη χημική ομάδα των τριαζολών και είναι υπεύθυνο για την αναστολή της βιοσύνθεσης των στερολών (υποομάδα DMIs).

### τρόπος δράσης

Κατά την εφαρμογή του το **Karamat™ 2,5EW** (*fenbuconazole*) διεισδύει στο εσωτερικό του φυτού και κινείται διασυστηματικά. Επίσης έχει πολύ καλή προσκόλληση στην κηρώδη επιφάνεια, προσφέροντας υψηλή αντοχή στην έκπλυση.



- Προσκόλληση στην κηρώδη
- Διασυστηματική κίνηση



## Karamat™ 2,5EW | Κυκλοκόνιο

Το Karamat™ 2,5EW ελέγχει πλήθος σοβαρών ασθενειών. Μια εξ αυτών είναι το Κυκλοκόνιο (*Cycloconium oleaginum*) που προσβάλλει την ελιά και πιο συγκεκριμένα:

- Προσβάλλει όλα τα πράσινα μέρη του δένδρου.
- Τα δένδρα εξασθενούν και μειώνεται η παραγωγή τους.
- Οι χαρακτηριστικές κηλίδες της ασθένειας (μάτι παγωνιού) είναι πιο εμφανείς την άνοιξη και νωρίς το καλοκαίρι.
- Κατά την περίοδο αυτή το δένδρο μπορεί να απογυμνωθεί τελείως.



**Για τον έλεγχο του κυκλοκόνιου το Karamat™ 2,5EW μπορεί να εφαρμοστεί από την εποχή που διαχωρίζονται τα πρώτα φύλλα μέχρι και πριν την άνθηση.**

## φάσμα δράσης

Πεδίο εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος γρ./στρ. (max)	Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών
<b>Μπλοειδή:</b> Μηλιά, Αχλαδιά, Αχλαδιά - Nashi, Κυδωνιά, Μουσμουλιά (ήσσονος σημασίας)	<b>Φουζικλάδιο</b>	200	Εφαρμογή από το στάδιο της «ρόδινης κορυφής» και την ανάπτυξη των φύλλων ως την ωρίμανση των καρπών.	4
<b>Πυρηνόκαρπα:</b> Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηλιά, Κερασιά, Βυσσιλιά	<b>Φαιά Σήψη, Ωίδιο, Κυλινδροσπόριο κερασιάς, Σκωρίαση, Ανθράκωση</b>	300	Με το ξεδίπλωμα των φύλλων και την ανάπτυξη των βλαστών ως την ωρίμανση των καρπών.	4
<b>Αμυγδαλιά</b>	<b>Φαιά Σήψη</b>	300	Με την έκπτυξη των οφθαλμών/ αρχή της άνθησης έως το τέλος της άνθησης.	2
<b>Φισικιά</b> (ήσσονος σημασίας)	<b>Σεπτόρια Σκωρίαση Βοτρυοσφάγια</b>	300	Με την έκπτυξη των οφθαλμών/ αρχή της άνθησης έως το τέλος της άνθησης.	2
<b>Αμπέλι</b> (Επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες)	<b>Ωίδιο</b>	150	Εφαρμογή πριν την άνθηση, όταν οι βλαστοί έχουν μήκος 5-10 εκ., και μέχρι της αλλαγής του χρώματος των ραγών, και ανάλογα των καιρικών συνθηκών που επικρατούν.	4
<b>Ελιά</b>	<b>Κυκλοκόνιο</b>	300	Από την εποχή που διαχωρίζονται τα πρώτα φύλλα μέχρι και πριν την άνθηση. Αλλαγή χρώματος της στεφάνης από πράσινο σε λευκό (πριν ανοίξουν τα πρώτα άνθη).	1
<b>Κολοκυνθοειδή Βρώσιμος φλοιός:</b> Αγγούρι (Υ+Θ), Κολοκυθάκια (Υ) <b>Μη βρώσιμος φλοιός:</b> Πεπόνι (Υ), Καρπούζι (Υ)	<b>Ωίδιο</b>	200	Με την εμφάνιση 3 πραγματικών φύλλων στον κύριο βλαστό έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών.	3

## Πλεονεκτήματα χρήσης

- > Πολύ καλή αποτελεσματικότητα
- > Προσφέρει προληπτική και θεραπευτική δράση
- > Αντοχή στην έκπλυση λόγω ισχυρής προσκόλλησης του **Karamat™ 2,5EW** στην κηρώδη επιφάνεια
- > Ασφαλές στις εγκεκριμένες καλλιέργειες
- > Πολύ καλό περιβαλλοντικό προφίλ
- > Κατάλληλο σε Προγράμματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (IPM)



### ΠΡΟΣΟΧΗ

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 60.475 /15-09-2015



ΕΣΥΦ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΥΝΑΕΣΙΣ  
ΦΥΤΟΦΡΟΣΤΑΣΕΩΣ



**Dow AgroSciences**

*Solutions for the Growing World*

**ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.**  
ΑΘΗΝΑ: Μεσογείων 335, 152 31 Χαλάνδρι  
Τηλ.: 213 0065000 ΘΕΣ/ΚΗ: Τηλ.: 2310 289100  
E-mail: [contact@elanco.gr](mailto:contact@elanco.gr), [www.elanco.gr](http://www.elanco.gr)

