

Πλεονεκτήματα μικροκάψουλας Most Micro 365CS

- Νέα μοναδική τεχνολογία
- Σταδιακή – συνεχής αποδέσμευση δραστικής ουσίας
- Μεγάλη διάρκεια δράσης
- Σταθερά υψηλή αποτελεσματικότητα
- Καλό περιβαλλοντικό προφίλ
- Όχι έντονες οσμές
- Ευκολία στον καθαρισμό των ψεκαστικών

Οδηγίες σωστής χρήσης

- Προετοιμάστε καλή σποροκλίνη, επίπεδη, ψιλοχωματισμένη και αρκετά συμπαγή.
- Ποτίστε εάν δεν βρέξει μέσα σε 7-10 ημέρες από την εφαρμογή ώστε να ενσωματωθεί το φάρμακο στο επιφανειακό στρώμα του εδάφους.
- Σπείρετε τις καλλιέργειες σε ομοιόμορφο βάθος σποράς τουλάχιστον 3 εκ. για τα καρότα και τα κρεμμύδια και 4 εκ. για τις υπόλοιπες καλλιέργειες, έτσι ώστε να μην ξεσκεπάζονται ή μένουν σπόροι στην επιφάνεια.
- Στις μεταφυτευόμενες καλλιέργειες (τομάτα, πιπεριά και καπνό) εφαρμόστε το MOST MICRO 365 CS σε καλή ψιλοχωματισμένο έδαφος τουλάχιστον 7-8 ημέρες πριν την μεταφύτευση. Ενσωματώστε με ελαφρύ πότισμα το οποίο πρέπει να επαναληφθεί μετά την μεταφύτευση. Σε καμία περίπτωση μη κάνετε "γέμισμα" (τράβηγμα χώματος στην ρίζα) πριν περάσουν τουλάχιστον 30 ημέρες από την εφαρμογή.
- Οι μικρότερες δόσεις αναφέρονται σε ελαφριά εδάφη - χαμηλής περιεκτικότητας σε οργανική ουσία και μικρούς πληθυσμούς ζιζανίων, ενώ οι μεγαλύτερες σε μέσης σύστασης ή βαριά εδάφη – μέσης έως υψηλής περιεκτικότητας σε οργανική ουσία ή/και μεγαλύτερους πληθυσμούς ζιζανίων.
- Το προϊόν είναι αποτελεσματικό και καταπολεμά τα ζιζάνια που φυτρώνουν ή βρίσκονται σε πολύ νεαρό στάδιο (φύτρωμα - κοτυληδόνες). Εφόσον υπάρχουν φυτρωμένα ζιζάνια θα πρέπει προηγουμένως να καταστραφούν με σκάλισμα ή βοτάνισμα ή με κατάλληλο μεταφυτωτικό ζιζανιοκτόνο.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάσετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.



ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ

ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΑΘΗΝΑ: Μεσογείων 335, 152 31 Χαλάνδρι
Τηλ.: 213 006 5000
ΘΕΣ/ΚΗ: Τηλ.: 2310 289 100
E-mail: contact@elanco.gr
www.elanco.gr

Αρ. Εγκρ. Κυκλ.: 7951/1-3-2011-31-12-2013

02/2018

Most® Micro 365CS

Pendimethalin 36.5%

Νέα Τεχνολογία Εξέλιξη - Δράση - Αποτελεσματικότητα



Most® Micro 365CS

Pendimethalin 36.5%

Εναιώρημα μικροκάψουλών

Το **Most Micro 365CS** είναι ένα εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών και πηλατύφυλλων ζιζανίων που δρα παρεμποδίζοντας την βλάστηση του σπόρου και την ανάπτυξη των νεαρών ζιζανίων.

Το **Most Micro 365CS** αποτελεί ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό προϊόν χάρη στον μοναδικό τρόπο παρασκευής της μικροκάψουλας που είναι απόρροια της υψηλής τεχνογνωσίας της εταιρείας Sircam στην διαδικασία διαμόρφωσης αυτής.

Περιγραφή μορφής σκευάσματος – περιγραφή μορφής και τρόπου δράσης της μικροκάψουλας.

Το προϊόν περιέχει νερό και μικροκάψουλες



Κάθε μικροκάψουλα διαστάσεων 5-7 micron (1 micron = 1/1000 του mm) αποτελείται από ένα περίβλημα που περιέχει στο εσωτερικό του, τη δραστική ουσία



Η δραστική ουσία, μετά την εφαρμογή, απελευθερώνεται από την κάψουλα και έρχεται σε επαφή με το φυτό-στόχο



Η υψηλή αποτελεσματικότητα του σκευάσματος οφείλεται στην σταθερή και συνεχή αποδέσμευση της δραστικής ουσίας από την μικροκάψουλα.



Με τον τρόπο δράσης της μικροκάψουλας του Most Micro 365CS επιτυγχάνεται:

- Η αναστολή της βλάστησης των σπόρων και της ανάπτυξης των νεαρών φυταρίων
- Η καλή αποτελεσματικότητα σε ένα ευρύ φάσμα αγρωστωδών και πηλατυφύλλων ζιζανίων
- Μεγάλη διάρκεια δράσης κατά των ζιζανίων
- Ευελιξία ως προς την δόση εφαρμογής (ανάλογα την καλλιέργεια)
- Χαμηλές δόσεις δραστικής ουσίας ανά στρέμμα

Το **Most Micro 365CS** σε βιοχημικό επίπεδο επηρεάζει τη λειτουργία της μίτωσης με παρεμπόδιση του σχηματισμού των μικροσωληνίσκων της μιτωτικής ατράκτου.

Συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΔΟΣΕΙΣ κ. εκ. σκ./στρ.	ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Εσπεριδοειδή: -Πορτοκαλιά -Λεμονια -Μανταρινιά Ακρόδρυα: -Αμυγδαλιά -Καρυδιά -Φουντουκιά Μηλοειδή: -Μηλιά -Αχλαδιά Πυρηνόκαρπα: -Ροδακινιά -Νεκταρινιά -Βερικοκιά -Κερασιά	250-300	Κατευθυνόμενος ψεκασμός προφυτρωτικά των ζιζανίων μεταξύ των γραμμών φύτευσης την άνοιξη ή το φθινόπωρο χωρίς να βρέχονται τα πράσινα μέρη των δένδρων. Κατευθυνόμενος ψεκασμός προφυτρωτικά των ζιζανίων μεταξύ των γραμμών φύτευσης το χειμώνα (πριν την έναρξη της βλάστησης).
Αμπέλι	250-300	Κατευθυνόμενος ψεκασμός προφυτρωτικά των ζιζανίων μεταξύ των γραμμών φύτευσης, το χειμώνα (κατά το λήθαργο, πριν την έναρξη της βλάστησης).
Καρότο	200-250	Προφυτρωτικά της καλλιέργειας.
-Κρεμμύδι -Σκόρδο	100-250	Προφυτρωτικά ή μεταφυτρωτικά της καλλιέργειας (στο στάδιο των 2-3 φύλλων).
-Τομάτα -Πιπεριά Μαρούλι	125-220 150-200	Πριν τη μεταφύτευση.
Αρακάς Φασολάκια νωπά Όσπρια: -Φασόλι Ηλίανθος	170-250 200-300	Προφυτρωτικά της καλλιέργειας.
Σόγια Βαμβάκι	200-250 200-300	Προσπαρτικά με ενσωμάτωση ή προφυτρωτικά της καλλιέργειας.
Πατάτα -Σιτάρι Αραβόσιτος	170-300 200-300	Προφυτρωτικά της καλλιέργειας.
Καπνός	125-300	Πριν τη μεταφύτευση.
Καλλωπιστικά	250-300	Κατευθυνόμενος ψεκασμός προφυτρωτικά των ζιζανίων μεταξύ των γραμμών φύτευσης μετά τη μεταφύτευση, σε καλά εγκατεστημένες φυτείες.

Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα: 20-40

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών / καλλιεργητική περίοδο: 1

Κυριότερα καταπολεμούμενα ζιζάνια

Ευαίσθητα ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια: *Alopecurus myosuroides* (αίλενονουρά), *Digitaria sanguinalis* (αιματοχορτό), *Echinochloa crus-galli* (μουχρίτσα), *Panicum dichotomiflorum* (πάνικο διχοτομικό), *Setaria viridis* (σετάρια πράσινη), *Setaria verticillata* (σετάρια σπονδυλωτή), *Poa annua* (κοινή πόα).

Ευαίσθητα ετήσια πηλατύφυλλα ζιζάνια: *Amaranthus retroflexus* (τραχύ βλήτο), *Amaranthus blitoides* (πηλαγιστό βλήτο), *Anagallis arvensis* (αναγαλλίδα), *Capsella bursa-pastoris* (καψέλλα), *Cardamine hirsuta* (καρδαμίνη), *Chenopodium album* (ρουβουδιά), *Euphorbia spp.* (γαλατσίδες), *Polygonum persicaria* (αγριοπιπεριά), *Polygonum aviculare* (πολυκόμνη), *Polygonum lapathifolium* (λαπάτσα), *Bilderdykia convolvulus* (αναρριχώμενο πολύγωνο), *Portulaca oleracea* (αντράκλα), *Solanum nigrum* (αγριοτοματιά ή στύφνος), *Sonchus oleraceus* (ζωχός), *Stachys annua* (στάχυσ), *Stellaria media* (σελλήαρια), *Urtica urens* (μικρή τσουκνίδα), *Veronica hederifolia*, *Veronica persica* (βερόνικα), *Viola arvensis* (κοινός αγριοπανσές).