

SELEBEL®

Εντομοκτόνο



**Πολύτιμη πρόταση
προστασίας**




FMC

SELEBEL®

Εντομοκτόνο

Δραστική ουσία
Chlorantraniliprole
5.17% β/ο

Μορφή
Συμπυκνωμένο
εναιώρημα (SC)



**Η δραστική ουσία
Chlorantraniliprole
ανήκει στην χημική
οικογένεια των
ανθρανιλικών
διαμιδίων.**



Το **Selebel®** είναι εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση των προνυμφών λεπιδοπτέρων και ορισμένων κολεοπτέρων.

Περιορίζει την δράση των ακμαίων σε ορισμένα έντομα και επιδεικνύει εξαιρετική ωο-προνυμφοκτόνο δράση.

Τρόπος δράσης


Η δραστική ουσία του **Selebel®**, δρα μέσω της ενεργοποίησης των υποδοχέων ρυανοδίνης των εντόμων.

Αυτή η ενεργοποίηση προκαλεί την απελευθέρωση ασβεστίου από τις εσωτερικές αποθήκες των μυών των εντόμων, με άμεσο αποτέλεσμα την μειωμένη μυϊκή λειτουργία, παράλυση και ακολούθως θανάτωση των εντόμων-στόχων.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

	ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ	ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ				
			κ.εκ./ 100 λίτρα	κ.εκ / στρμ.	Όγκος Ψεκ. Υγρού λίτρα/ στρμ.	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο	Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή
	Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μουσμουλιά	Καρπόκαψα (<i>Cydia pomonella</i> , <i>Cydia molesta</i>) Πυραλίδα (<i>Ostrinia nubilalis</i>), Φυλλορύκτες (<i>Phyllonorycter blancardella</i> , <i>Phyllonorycter corylifoliella</i> , <i>Leucoptera scitella</i>), Φυλλοδέτες (<i>Pandemis heparana</i> ή <i>Pandemis</i> sp., <i>Adoxophyes orana</i> , <i>Argyrotaenia ljungiana</i>)	77	77	100	1 κάθε 2 έτη (BBCH 71-87)	14 ημέρες
	Ροδακινιά, Βερικοκιά^{*1}	Καρπόκαψα (<i>Cydia molesta</i>), Ανάρσια (<i>Anarsia lineatella</i>), Αργυροταινία (<i>Argyrotaenia ljungiana</i>)	77	77	100	1 κάθε 2 έτη (BBCH 73-87)	14 ημέρες
	Δαμασκηνιά^{*2}	Γκραφολίτα (<i>Cydia funebrana</i>), Σκώρος (<i>Opherophthera brumata</i>), Καρπόκαψα (<i>Cydia molesta</i>)	77	77	100	1 κάθε 2 έτη (BBCH 73-87)	14 ημέρες
	Καρυδιά	Καρπόκαψα (<i>Cydia pomonella</i>)	77	77	100	1 κάθε 2 έτη (BBCH 73-87)	21 ημέρες
	Αμπέλι οиноποίησης	Ευδεμίδα (<i>Lobesia botrana</i>), Κογκυλίδα (<i>Eupoecilia ambiguella</i>), Αργυροταινία (<i>Argyrotaenia ljungiana</i>)	70-131	105	80-150	1 (BBCH 71-83) 1 κάθε 2 έτη (BBCH 57-59 & 69-83)	30 ημέρες
	Αμπέλι επιτραπέζιο	Ευδεμίδα (<i>Lobesia botrana</i>) Κογκυλίδα (<i>Eupoecilia ambiguella</i>), <i>Argyrotaenia pulchellana</i>	70-105	84	80-120	1 (BBCH 57-59 & BBCH 69-85) 2/10 κάθε 2 έτη (BBCH 71-85)	3 ημέρες
	Αραβόσιτος, Γλυκό καλαμπόκι	Πυραλίδα (<i>Ostrinia nubilalis</i>), Σεζάμια (<i>Sesamia nonagrioides</i>), Πρόσινο σκουλήκι (<i>Helicoverpa armigera</i>), Σποντόπτερα (<i>Spodoptera exigua</i>), <i>Spodoptera frugiperda</i> ^{*4}	-	58	20-80	1 (BBCH 20-55) 2/10 (BBCH 51-87)	Δεν ορίζεται 7 ημέρες
	Βαμβάκι	Πρόσινο σκουλήκι (<i>Helicoverpa armigera</i>), Ακανθώδες σκουλήκι (<i>Earias</i> spp., <i>Earias insulana</i> , <i>Earias vittella</i>), Σποντόπτερα (<i>Spodoptera exigua</i> , <i>Spodoptera littoralis</i>), <i>Spodoptera frugiperda</i> ^{*4}	-	77	30-80	2/10 (BBCH 34-59 & BBCH 69-77)	21 ημέρες
	Πατάτα	Φθοριμαία (<i>Phthorimaea operculella</i>) <i>Leptinotarsa decemlineata</i>	-	48-67 20-23	30-80	2/8 (BBCH 51-93) 2/14 (BBCH 31-69)	14 ημέρες
	Πορτοκαλιά, Μανταρινιά^{*3}, Λεμονιά, Πράσινα Λεμόνια (Lime)	Φυλλοκνίστης (<i>Phyllocnistis citrella</i>)	-	30	10-50	2/10 (BBCH 31-50)	Δεν ορίζεται

1. Η χρήση στη ροδακινιά περιλαμβάνει και τη νεκταρινιά
2. Η χρήση στη δαμασκηνιά περιλαμβάνει και την κορομηλιά, την Ιαπωνική δαμασκηνιά και την τζίτζιφιά.
3. Η χρήση στη μανταρινιά περιλαμβάνει και τις κλημεντίνες, τη σασσούμα και τις ταγγερίνες
4. Χρήση ήσσονος σημασίας





SELEBEL®

Εντομοκτόνο

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά
(ΑΑΔΑ): 14877 / 20.09.2024



Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

ΕΛΑΝΚΟ
Τ'πάντα δίπλα σου!

ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΑΘΗΝΑ: Μεσογείων 335, 152 31 Χαλάνδρι, Τηλ.: 213 006 5000,

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Τηλ.: 2310 289 100

E-mail: contact@elanco.gr, www.elanco.gr

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 352801000

FMC

05/2025