

# CEΤΟΦΛΟΡΕ

## Συμπληρωματική ζωοτροφή για μηρυκαστικά

Είδη ζωών: Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής, προβατίνες και αίγες

**Σύνθεση:** (13.1.1) Προϊόντα της αρτοποιίας και της βιομηχανίας ζυμαρικών (έχουν υποστεί ζύμωση), (13.5.5) Σορβιτόλη, (12.1.5) Ζύμης (Αδρανοποιημένο στέλεχος ζύμης *Saccharomyces cerevisiae*), (13.6.3) Μονογλυκερίδια, διγλυκερίδια και τριγλυκερίδια λιπαρών οξέων (στεατικό οξύ και παλμτικό οξύ), (11.4.1) Χλωριούχο νάτριο.

**Πρόσθετες ύλες ανά κιλό (kg):**

**Βιταμίνες και προβιταμίνες:** 3a315 Νικοτινιμιδίο (Βιταμίνη PP): 75.000 mg/kg, 3a820 Βιταμίνη Β1 (Υδροχλωρική θειαμίνη): 420 mg/kg, 3a825ii Βιταμίνη Β2 (ΡΙβοφλαβίνη) σε στερεή μορφή που παράγεται από *Bacillus subtilis* DSM 17339 και/ή DSM 23984: 120 mg/kg, 3a Βιταμίνη Β12 (Κυανοκοβαλαμίνη): 42 mg/kg, 3a316 Φολικό οξύ (Βιταμίνη Β9): 85 mg/kg, 3a890 Χλωριούχος χολίνη: 12.500 mg/kg, 3a925 Άνυδρη βεταΐνη: 3.750 mg/kg.

**Ενώσεις ιχθυοστοχείων:** 3b201 Κοβάλτιο (ως τετραένυδρο οξικό κοβάλτιο(II)): 98,7 mg/kg.

**Αμινοξέα, άλατα αμινοξέων και ανάλογες ουσίες:** 3c301 DL-μεθειονίνη τεχνικής καθαρότητας: 27.500 mg/kg.

**Συντηρητικά:** 1k281 Προπονικό νάτριο: 335.000 mg/kg. **Αντιοξειδωτικά:** Ε 310 Γαλλικός προπυλεστέρας: 13 mg/kg, Ε 321 Βουτυλιωμένο υδροξυτολουόλιο (BHT): 263 mg/kg. **Συνδετικά, αντιπηκτικά και θρομβωτικά μέσα:** Ε 563 Σπειρολική άργιλος: 670 mg/kg.

**Αναλυτικά συστατικά:** Ολικές αζωτούχες ουσίες: 21 %, Ολικές ινώδεις ουσίες: 1,1 %, Ολικές λιπαρές ουσίες: 7 %, Ολική τέφρα: 23,3 %, Νάτριο: 8 %.

**Συνιστώμενη διάρκεια χρήσης:** Μεταξύ τριών εβδομάδων πριν και έξι εβδομάδων μετά τον τοκετό για αγελάδες γαλακτοπαραγωγής. Έξι εβδομάδες πριν και τρεις εβδομάδες μετά τον τοκετό για προβατίνες και αίγες. Κατά τη διάρκεια της χορήγησης προπιοπινών αλάτων ασβεστίου ή νατρίου στο τέλος της κύησης, είναι αναγκαία η αξιολόγηση της ισορροπίας των μεταλλικών αλάτων σε συνδυασμό με τον κίνδυνο υπασβεστιαιμίας μετά τον τοκετό. Πρέπει να ζητηθεί η γνώμη κτηνιάτρου πριν από τη χρήση των ζωοτροφών ή πριν από την παράταση της περιόδου χρήσης. Θα πρέπει να ληφθούν προστατευτικά μέτρα για την αποφυγή έκθεσης στο κοβάλτιο μέσω εισπνοής ή μέσω του δέρματος.

**Αποθήκευση:** Αποθηκεύστε σε δροσερό, ξηρό μέρος.

Εταιρεία/Παρασκευαστής : TECHNOMET-ROTONIC Z.A. de Lumunoch, 200 Rue Pierre & Marie Curie, 29510 BRIEC, FRANCE, Tel.: (+33) 02 98 64 46 32. Αριθμός Έγκρισης: aFR29020702.

Η ταυτόχρονη χρήση διαφορετικών οργανικών οξέων ή αλάτων τους αντενδείκνυται όταν ένα ή περισσότερα απ' αυτά χρησιμοποιούνται στη μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα ή την προσαγωγή τους. Το μείγμα διαφόρων πηγών προπιοπινού νατρίου δεν υπερβαίνει τα ανώτατα επιτρεπόμενα επίπεδα στις πλήρεις ζωοτροφές.

Διανομέας:



ELANKO ELLAS A.E.B.E.

Λεωφόρος Μεσογείων 335, 152 31 Χαλάνδρι, Αττική, Ελλάδα

Τηλ: (+30) 2130065000

Θεσσαλονίκη: Τηλ: (+30) 2310289100

www.elanco.gr - e-mail: contact@elanco.gr

Αριθμός Έγκρισης/Approval number: eL5400030

Αριθμός εγγραφής/Registration number: 22200 540 000033

Καθαρό βάρος:  
100 g

## Οδηγίες για τη σωστή χρήση:

Από του στόματος χρήση. Δώστε το προϊόν σε μορφή εναιωρήματος σε νερό χρησιμοποιώντας ένα κατάλληλο εργαλείο χορήγησης.

**Συντήρηση - Συνήθης/Κανονική δοσολογία, για 3 έως 4 ημέρες:**

Ενήλικες αγελάδες γαλακτοπαραγωγής: 50 g (½ φακελάκιος) ανά ζώο ανά ημέρα.

Νεαρής ηλικίας αγελάδες γαλακτοπαραγωγής, Πρόβατα και Αίγες: 25 g (¼ φακελάκιος) ανά ζώο ανά ημέρα.

**Εντατική δοσολογία, για 3 έως 4 ημέρες, ανά διαστήματα 24 ωρών:**

Ενήλικες αγελάδες γαλακτοπαραγωγής: 100 g (1 φακελάκιος) ανά ζώο ανά ημέρα.

Νεαρής ηλικίας αγελάδες γαλακτοπαραγωγής: 50 g (½ φακελάκιος) ανά ζώο ανά ημέρα.

Πρόβατα, Αίγες: 25 g (¼ φακελάκιος) ανά ζώο ανά ημέρα.

Αριθμός Παρτίδας/Batch:

Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από: