

CEΤΟΦΛΟΡΕ

Συμπληρωματική ζωοτροφή για μηρυκαστικά

Είδη ζώων: Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής, προβατίνες και αιγες

Σύνθεση: (13.1.1) Προϊόντα της αρτοποιίας και της βιομηχανίας ζυμαρικών (έχουν υποστεί ζύμωση), (13.5.5) Σορβιτόλη, (12.1.5) Ζύμες (Αδρανοποιημένο στέλεχος ζύμης *Saccharomyces cerevisiae*), (13.6.3) Μονογλυκερίδια, διγλυκερίδια και τριγλυκερίδια λιπαρών οξέων (στεατικό οξύ και παλμιτικό οξύ), (11.4.1) Χλωριούχο νάτριο.

Πρόσθετες ύλες ανά κιλό (kg):

Βιταμίνες και προβιταμίνες: 3a315 Νικοτιναμίδιο (Βιταμίνη PP): 75.000 mg/kg, 3a820 Βιταμίνη Β1 (Υδροχλωρική θειαμίνη): 420 mg/kg, 3a825ii Βιταμίνη Β2 (ΡΙβοφλαβίνη) σε στερεή μορφή που παράγεται από *Bacillus subtilis* DSM 17339 και/ή DSM 23984: 120 mg/kg, 3a Βιταμίνη Β12 (Κυανοκοβαλαμίνη): 42 mg/kg, 3a316 Φολικό οξύ (Βιταμίνη Β9): 85 mg/kg, 3a890 Χλωριούχος χολίνη: 12.500 mg/kg, 3a925 Άνυδρη βεταΐνη: 3.750 mg/kg.

Ενώσεις ιχθυοστοιχείων: 3b201 Κοβάλτιο (ως τετραένυδρο οξικό κοβάλτιο(II)): 98,7 mg/kg.

Αμινοξέα, αλάτα αμινοξέων και ανάλογες ουσίες: 3c301 DL-μεθειονίνη τεχνικής καθαρότητας: 27.500 mg/kg.

Συντηρητικά: 1k281 Προπιονικό νάτριο: 335.000 mg/kg. **Αντιοξειδωτικά:** Ε 310 Γαλλικός προπιλυσετέρας: 13 mg/kg, Ε 321 Βουτυλιωμένο υδροξυτολουόλιο (ΒΗΤ): 263 mg/kg. **Συνδετικά, αντιπηκτικά και θρομβωτικά μέσα:** Ε 563 Σεπιολιθική άργιλος: 670 mg/kg.

Αναλυτικά συστατικά: Ολικές αζωτούχες ουσίες: 21 %, Ολικές ινώδεις ουσίες: 1,1 %, Ολικές λιπαρές ουσίες: 7 %, Ολική τέφρα: 23,3 %, Νάτριο: 8 %.

Συνιστώμενη διάρκεια χρήσης: Μεταξύ τριών εβδομάδων πριν και έξι εβδομάδων μετά τον τοκετό για αγελάδες γαλακτοπαραγωγής. Έξι εβδομάδες πριν και τρεις εβδομάδες μετά τον τοκετό για προβατίνες και αιγες. Κατά τη διάρκεια της χορήγησης προπιονικών αλάτων ασβεστίου ή νατρίου στο τέλος της κύησης, είναι αναγκαία η αξιολόγηση της ισορροπίας των μεταλλικών αλάτων σε συνδυασμό με τον κίνδυνο υπασβεστιαμίας μετά τον τοκετό. Πρέπει να ζητηθεί η γνώμη κτηνιάτρου πριν από τη χρήση των ζωοτροφών ή πριν από την παράταση της περιόδου χρήσης. Θα πρέπει να ληφθούν προστατευτικά μέτρα για την αποφυγή έκθεσης στο κοβάλτιο μέσω εισπνοής ή μέσω του δέρματος.

Αποθήκευση: Αποθηκεύστε σε δροσερό, ξηρό μέρος.

Εταιρεία/Παρασκευαστής: : TECHNOVET-EUROTONIC Z.A. de lumunoch, 200 Rue Pierre & Marie Curie, 29510 BRIEC, FRANCE, Tel.: (+33) 02 98 64 46 32. Αριθμός Έγκρισης: αFR29020702.

Η ταυτόχρονη χρήση διαφορετικών οργανικών οξέων ή αλάτων τους αντενδείκνυται όταν ένα ή περισσότερα απ' αυτά χρησιμοποιούνται στη μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα ή την προσεγγίζουν. Το μείγμα διαφόρων πηγών προπιονικού νατρίου δεν υπερβαίνει τα ανώτατα επιτρεπόμενα επίπεδα στις πλήρεις ζωοτροφές.

Διανομέας:



ELANCO ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.

Λεωφόρος Μεσογείων 335, 152 31 Χαλάνδρι, Αττική, Ελλάδα

Τηλ.: (+30) 2130065000

Θεσσαλονίκη: Τηλ.: (+30) 2310289100

www.elanco.gr - e-mail: contact@elanco.gr

Αριθμός έγκρισης/Approval number: αEL5400030

Αριθμός εγγραφής/Registration number: 22200 540 000033

Κουτί με 24
φακελίσκους των
100 g

Αριθμός Παρτίδας/Batch:

Ανάλωση κατά προτίμηση
πριν από:

Οδηγίες για τη σωστή χρήση:

Από του στόματος χρήση. Δώστε το προϊόν σε μορφή
ελαιώδη σε νερό χρησιμοποιώντας ένα κατάλληλο εργαλείο χορήγησης.

Συντήρηση - Συνήθης/Κανονική δοσολογία, για 3 έως 4 ημέρες:

Ενήλικες αγελάδες γαλακτοπαραγωγής: 50 g (½ φακελίσκος) ανά
ζώο ανά ημέρα.

Νεαρής ηλικίας αγελάδες γαλακτοπαραγωγής, Πρόβατα και Αιγες:
25 g (¼ φακελίσκου) ανά ζώο ανά ημέρα.

Εντατική δοσολογία, για 3 έως 4 ημέρες, ανά διαστήματα 24 ωρών:

Ενήλικες αγελάδες γαλακτοπαραγωγής: 100 g (1 φακελίσκος) ανά ζώο ανά ημέρα.

Νεαρής ηλικίας αγελάδες γαλακτοπαραγωγής: 50 g (½ φακελίσκος) ανά ζώο ανά ημέρα.

Πρόβατα, Αιγες: 25 g (¼ φακελίσκου) ανά ζώο ανά ημέρα.