Παρασκευάζεται στη Γαλλία

# VITAMOX

**Διαιτητική συμπληρωματική ζωοτροφή**
**Ειδικοί διατροφικοί σκοποί: Υποστήριξη της προετοιμασίας του οίστρου και της αναπαραγωγής,**
**Υποστήριξη των διατροφικών ανισορροπιών στη διατροφική μετάβαση.**
**Είδη ζώων: Μηρυκαστικά, Χοίροι, Πουλερικά**

**ΣΥΝΘΕΣΗ**:
•(13.11.1) Προπυλενογλυκόλη • (13.5.5) Σορβιτόλη
**Αναλυτικά συστατικά:**
Υγρασία: 78,084%, Ολικές αζωτούχες ουσίες: 4,760%, Ολικές ινώδεις ουσίες: <0,001%, Ολικές λιπαρές ουσίες: 3,357%, Ολική τέφρα: 0,175%, Λυσίνη: 2,852%, Μεθειονίνη: 1,921%, Νάτριο: 0,137%.
**Πρόσθετες ύλες ανά λίτρο (Litre):**
**Βιταμίνες και προβιταμίνες:**
3a672b Βιταμίνη A (Παλμιτικό ρετινύλιο): 4.200.000,00 IU/L
3a671 Βιταμίνη D3 (Χοληκαλσιφερόλη): 1.000.000,00 IU/L
3a315 Νικοτιναμίδιο: 21.000,00 mg/L
3a700 Βιταμίνη E (ρακεμικό μείγμα όλων των στερεοϊσομερών της οξικής α-τοκοφερόλης): 16.850,00 mg/L
3a311 Βιταμίνη C (Ασκορβυλοφωσφορικό νάτριο): 10.000,00 mg/L,
3a842 D-πανθενόλη: 5.250,00 mg/L
3a820 Βιταμίνη B1 (Υδροχλωρική θειαμίνη): 2.100,00 mg/L
3a831 Βιταμίνη B6 (Υδροχλωρική πυριδοξίνη): 2.100,00 mg/L
3a826 Βιταμίνη B2 (Μονονατριούχο άλας της 5′-φωσφορικής ριβοφλαβίνης): 2.080,00 mg/L
3a836 Βιταμίνη B12 (Κυανοκοβαλαμίνη): 11,00 mg/L
3a880 Βιοτίνη: 11,00 mg/L.

**Αμινοξέα, άλατα αμινοξέων και ανάλογες ουσίες:**
3c322 Μονοϋδροχλωρική L-λυσίνη, τεχνικώς καθαρή που παράγεται από ζύμωση με Escherichia coli CGMCC 7.57: 30.000,00 mg/L
3c307 Υδροξυ-ανάλογο της μεθειονίνης: 20.000,00 mg/L.
**Συντηρητικά:**
1a330 Κιτρικό οξύ: 40.000,00 mg/L
1k280 Προπιονικό οξύ: 1.484,57 mg/L
1a260 Οξικό οξύ: 801,65 mg/L
1k281 Προπιονικό νάτριο: 674,21 mg/L
Αντιστοιχεί σε Προπιονικό οξύ: 518,47 mg/L
1k202 Σορβικό κάλιο: 21,78 mg/L
Αντιστοιχεί σε Σορβικό οξύ: 16,27 mg/L.
**Γενικές οδηγίες για σωστή και κατάλληλη χρήση:**
Ανακινήστε πριν από τη χρήση. Να χρησιμοποιείται αραιωμένο/διαλυμένο σε νερό. Η δόση πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα με την ημερήσια κατανάλωση σύμφωνα με την παρακάτω μέγιστη δοσολογία για τα είδη ζώων.
Πριν από τη χρήση συνιστάται να ληφθεί η γνώμη ειδικού διατροφολόγου ή κτηνιάτρου όπως και για την παράταση της περιόδου χρήσης. Το προϊόν αυτό προορίζεται να χρησιμοποιηθεί μόνο από παρασκευαστές ζωοτροφών.
Το μείγμα διαφόρων πηγών κιτρικού οξέος, προπιονικού οξέος, οξικού οξέος,και σορβικού καλίου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα ανώτατα επιτρεπόμενα επίπεδα στις πλήρεις ζωοτροφές. Η ταυτόχρονη χρήση διαφορετικών οργανικών οξέων ή αλάτων τους αντενδείκνυται όταν ένα ή περισσότερα απ' αυτά χρησιμοποιούνται στη μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα ή την προσεγγίζουν.

**Συνθήκες αποθήκευσης:** Το προϊόν πρέπει να παραμένει αποθηκευμένο στην αρχική συσκευασία, ερμητικά κλειστό, προστατευμένο από το φως μεταξύ 5 και 25 °C.
**Επωνυμία Εταιρείας/Διανομέας:**

ΕΛΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ

alphatech by your side

**ΕΛΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε./ELANCO HELLAS S.A.C.I.**
Λεωφόρος Μεσογείων 335, 152 31 Χαλάνδρι, Αττική, Ελλάδα
335, Messogion Avenue, 152 31 Chalandri, Attica, Greece
Τηλ/Tel.: (+30) 2130065000
Θεσσαλονίκη/Thessaloniki: Τηλ/Tel.: (+30) 2310289100
Αριθμός έγκρισης/Approval number: αEL5400030
Αριθμός εγγραφής/Registration number: 22200 540 000033

**Δοσολογία και διάρκεια χρήσης για τα είδη ζώων όπως παρακάτω:**
**Υποστήριξη της προετοιμασίας του οίστρου και της αναπαραγωγής**
Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής: 47mL σε 1L νερού ανά ζώο και ανά ημέρα, 2 εβδομάδες πριν από το τέλος της κύησης και μέχρι την επιβεβαίωση της επόμενης κύησης.
Θηλάζουσες και ξηρές αγελάδες: 32mL σε 1L νερού ανά ζώο και ανά ημέρα, 2 εβδομάδες πριν από το τέλος της κύησης και μέχρι την επιβεβαίωση της επόμενης κύησης.
Δαμαλίδες/δαμάλες: 38mL σε 1L νερού ανά ζώο και ανά ημέρα, 2 εβδομάδες πριν από το τέλος της κύησης και μέχρι την επιβεβαίωση της επόμενης κύησης.
Νεαρά βοοειδή, Νεαροί ταύροι: 14mL σε 1L νερού ανά ζώο και ανά ημέρα.
Για τα θηλυκά: από το τελευταίο διάστημα της κύησης μέχρι την επιβεβαίωση της επόμενης κύησης.
Για τα αρσενικά: κατά τη διάρκεια των περιόδων αναπαραγωγικής δραστηριότητας.
Απογαλακτισμένοι μόσχοι, πρόβατα και αίγες: 5mL σε 1L νερού ανά ζώο και ανά ημέρα.
Για τα θηλυκά: από το τελευταίο διάστημα της κύησης μέχρι την επιβεβαίωση της επόμενης κύησης.
Για τα αρσενικά: κατά τη διάρκεια των περιόδων αναπαραγωγικής δραστηριότητας.
Αίγες γαλακτοπαραγωγής: 6mL σε 1L νερού ανά ζώο και ανά ημέρα, από το τελευταίο διάστημα της κύησης μέχρι την επιβεβαίωση της επόμενης κύησης.
Προβατίνες γαλακτοπαραγωγής/πρόβατα: 12mL σε 1L νερού ανά ζώο και ανά ημέρα, από το τελευταίο διάστημα της κύησης μέχρι την επιβεβαίωση της επόμενης κύησης.
Χοίροι αναπαραγωγής: 6mL σε 1L νερού ανά ζώο και ανά ημέρα.
Για τα θηλυκά (χοιρομητέρες): 7 ημέρες πριν και έως 3 ημέρες μετά τον τοκετό και 7 ημέρες πριν και έως 3 ημέρες μετά το ζευγάρωμα.
Για τα αρσενικά: κατά τη διάρκεια των περιόδων αναπαραγωγικής δραστηριότητας.
Όρνιθες: Ηλικία<14 ημερών: 2L σε 1000L νερού. Ηλικία>14 ημερών: 1,1L σε 1000L νερού, ανά ζώο και ανά ημέρα.
Για τα θηλυκά: κατά τη διάρκεια του οίστρου.
Για τα αρσενικά: κατά τη διάρκεια των περιόδων αναπαραγωγικής δραστηριότητας.
Όρνιθες ωοπαραγωγής: 1,1L σε 1000L νερού ανά ζώο και ανά ημέρα, κατά τη διάρκεια του οίστρου.
Γαλοπούλες: Ηλικία<28 ημερών: 1,9L σε 1000L νερού. Ηλικία>28 ημερών: 1,1L σε 1000L νερού, ανά ζώο και ανά ημέρα.
Για τα θηλυκά: κατά τη διάρκεια του οίστρου.
Για τα αρσενικά: κατά τη διάρκεια των περιόδων αναπαραγωγικής δραστηριότητας.
Φραγκόκοτες: Ηλικία<14 ημερών: 1,6L σε 1000L νερού ανά ζώο και ανά ημέρα.
Ηλικία>14 ημερών: 1,1L σε 1000L νερού ανά ζώο και ανά ημέρα.
Για τα θηλυκά: κατά τη διάρκεια του οίστρου.
Για τα αρσενικά: κατά τη διάρκεια των περιόδων αναπαραγωγικής δραστηριότητας.

**Υποστήριξη των διατροφικών ανισορροπιών στη διατροφική μετάβαση**
**Συνιστώμενη διάρκεια: από 2 έως 15 ημέρες**
Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής: 47mL σε 1L νερού ανά ζώο και ανά ημέρα.
Θηλάζουσες και ξηρές αγελάδες: 32mL σε 1L νερού ανά ζώο και ανά ημέρα.
Δαμαλίδες/δαμάλες: 38mL σε 1L νερού ανά ζώο και ανά ημέρα.
Νεαρά βοοειδή, νεαροί ταύροι: 14mL σε 1L νερού ανά ζώο και ανά ημέρα.
Απογαλακτισμένοι μόσχοι, πρόβατα και αίγες: 5mL σε 1L νερού ανά ζώο και ανά ημέρα.
Αίγες γαλακτοπαραγωγής: 6mL σε 1L νερού ανά ζώο και ανά ημέρα.
Προβατίνες γαλακτοπαραγωγής/πρόβατα: 12mL σε 1L νερού ανά ζώο και ανά ημέρα.
Χοίροι αναπαραγωγής: 6mL σε 1L νερού ανά ζώο και ανά ημέρα.
Όρνιθες: Ηλικία<14 ημερών: 2L σε 1000L νερού. Ηλικία>14 ημερών: 1,1L σε 1000L νερού ανά ζώο και ανά ημέρα.
Όρνιθες ωοπαραγωγής: 1,1L σε 1000L νερού ανά ζώο και ανά ημέρα.
Γαλοπούλες: Ηλικία<28 ημερών: 1,9L σε 1000L νερού. Ηλικία>28 ημερών: 1,1L σε 1000L νερού ανά ζώο και ανά ημέρα. Φραγκόκοτες: Ηλικία<14 ημερών: 1,6L σε 1000L νερού. Ηλικία>14 ημερών: 1,1L σε 1000L νερού ανά ζώο και ανά ημέρα.

**Αριθμός Παρτίδας/Batch:**
**Καθαρός όγκος:** 1 L (Λίτρο)
**Ημερομηνία παρασκευής:** MM/EEEE
**Ελάχιστη διάρκεια αποθήκευσης/ζωής:**
Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από: MM/EEEE

**Στοιχεία Παρασκευαστή:** ALPHATECH - ZI du Grand Plessis - 22940 PLAINTEL (France)
Tél.: (+33) 296326990 - Fax: (+33) 296326999 - E-mail: contact.export@alphatech-france.eu

Feed Chain Alliance • together for safety and quality

Alpha FR 22 171 015