

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

TYLAN®200

Ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή και χοίρους

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:

Elanco GmbH
Heinz-Lohmann-Str. 4
27472 Cuxhaven
Γερμανία

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΤΙΔΩΝ:

Elanco France S.A.S, 26 Rue de la Chapelle, 68330 Huningue, Γαλλία

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

Tylan 200 mg/ml - Ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή και χοίρους.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ:

Δραστική ουσία: Tylosin 200 mg/ml
Benzyl alcohol 0,04 ml/ml
Propylene glycol 0,5 ml/ml

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:

Βοοειδή: Για τη θεραπεία της μαστίτιδας σε αγελάδες που προκαλείται από *Streptococcus spp.*, *Staphylococcus spp.* και μητρίτιδος που προκαλείται από *Arcanobacterium pyogenes*. Για τη θεραπεία της ποδοδερματίτιδος που προκαλείται από *Fusobacterium necrophorum* και της πνευμονίας που προκαλείται από *Pasteurella multocida* και *Mycoplasma spp.*

Χοίροι: Για τη θεραπεία της ενζωτικής πνευμονίας που προκαλείται από *Mycoplasma hyopneumoniae* και της ερυθράς που προκαλείται από *Erysipelothrix insidiosa*. Για τη θεραπεία της δυσεντερίας που προκαλείται από *Brachyspira hyodysenteriae* και τη βακτηριακή αρθρίτιδα.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:

Δε χρησιμοποιείται στα ιπποειδή στα οποία ένεση τυλοζίνης είναι δυνατό να προκαλέσει θάνατο. Να μη χορηγείται σε κουνέλια. Να μη χορηγείται σε ζώα με υπερευαισθησία στην τυλοζίνη. Να μη χορηγείται σε ζώα με ηπατική ή νεφρική ανεπάρκεια.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:

Η υποδόρια ένεση δημιουργεί επώδυνο ερεθισμό και τοπικό οίδημα.

Η ενδομυϊκή ένεση μπορεί να δημιουργήσει τοπική αντίδραση με νέκρωση και αιμορραγίες, 6 ημέρες μετά τη χορήγηση.

Σε μερικούς χοίρους έχει παρατηρηθεί οίδημα του βλεννογόνου και απευθυσμένου. Επίσης διάρροια, πρόπτωση του απευθυσμένου, ερύθημα και κνησμός.

Στις αγελάδες έχει αναφερθεί ταχυκαρδία και ταχύπνοια (αύξηση της συχνότητας των

καρδιακών παλμών και της αναπνοής).

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ:

Βοοειδή (αγελάδες, μόσχοι) και χοίροι.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:

Βοοειδή : Ενδομυϊκή ένεση 4-10 mg/kg σ.β. επί 2-4 ημέρες

Χοίροι : Ενδομυϊκή ένεση 2-10 mg/kg σ.β. επί 2-4 ημέρες

Για την επιβεβαίωση της σωστής δΟΣΟΛΟΓΙΑΣ, το σωματικό βάρος πρέπει να καθορίζεται κατά το δυνατόν επακριβώς προς αποφυγή υπερδοσολογίας. Στους χοίρους να μην χορηγείται ποσότητα μεγαλύτερη από 5 ml ανά σημείο ένεσης.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ:

Βοοειδή : 28 ημέρες

Χοίροι : Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 16 ημέρες.

Γάλα : 96 ώρες

ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

Να μη φυλάσσεται σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25°C.

Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δε βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.

Φυλάσσετε τον περιέκτη εντός της εξωτερικής συσκευασίας για την προστασία από το φως.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

Καμία.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμμάτα του, πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ:

03/2020

Αριθμός αδείας κυκλοφορίας: 53520/7-8-2007/Κ-0007301

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας:

ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε

335 Μεσογείων

15231, Χαλάνδρι

Αττική-Ελλάδα

Τηλ.: 2130065000