



ALPHASELEN

Διαιτητική συμπληρωματική ζωατροφή
Ειδικοί διατροφικοί σκοποί: Υποστήριξη της προετοιμασίας του οίστρου και της αναπαραγωγής.

Υποστήριξη των διατροφικών ανισορροπιών στη διατροφική μετάβαση
Ειδή ζωων: Μηρυκαστικά, Χοιρί, Πουλερικά



Σύνθεση:

• (13.11.1) Πρωτιπλενογλυκόλη • (13.5.5) Σορβιπόλη

Αναλυτικά συστατικά:

Υγρασία: 64,254%. Οικείες αιμοτύχες συστατικά <0,001%, Οικείες μώδεις συστατικά <0,001%, Οικείες λιπαρές συστατικά <0,001%, Οικείη τέφρη 0,055%, Λυσινή: <0,001%, Μεθενοτόνη: <0,001%, Νάτριος: <0,001%

Πρόσθετες ύλες ανά λίτρο (Litro):

Ενώσεις ιγνοστογείων: 8801 Σελήνιο 250 mg/L (ως Σελήνιοδες νάτριο 550 mg/L)

Βιταμίνες και προβιταμίνες:

Σε700 Βιταμίνη E (ροκακικό μέλιγμα όλων των στερεοισομερών της οξείας α-τοκοφερόλης): 100,000 mg/L

Οδηγίες για την ορθή χρήση:

Να αναμιγνύεται πριν από τη χρήση και να αραιώνεται σε νέρο σύμφωνα με την παρακάτω αναφερόμενη δοσολογία.

Η δόση πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα με την ημερήσια κατανάλωση σύμφωνα με την παρακάτω μέγιστη δοσολογία ανά είδος.

Πριν από τη χρήση συνιστάται να ληφθεί η γνωστή ειδικού διατροφολόγου ή κτηνίατρου όπως και για την παράσταση της περιόδου χρήσης.

Το προϊόν αυτό προορίζεται να χρησιμοποιηθεί μόνο από παρασκευαστές ζωατροφών.

Ανακυρώνεται πριν από τη χρήση.

Συνθήκες αποθήκευσης:

Φυλκίζεται το μακριά από το φως. αποθηκεύεται στην αρχική συσκευασία ερμηντική κλειστό και μεταξύ 5°C και 25°C.

Καθαρός όγκος: 1 L (Λίτρο)

Αριθμός Παρτίδων/Batch: 2310103

Ημερομηνία παρασκευής: 04/2023

Ελάχιστη διάρκεια αποθήκευσης/ζωής:

Ανάλογη κατά προτίμηση πριν από: 04/2025

Επωνυμία Εταιρείας/Διανομέας:



ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε./ELANCO HELLAS S.A.C.I.
Αλεπούρων Μεσογείου 335, 152 31 Χαλανδρί, Αττική, Ελλάδα
Τηλ/Τελ.: +(30) 2310065000
Θεσσαλονίκη/Thessaloniki: Τηλ/Τελ.: +(30) 2310289100
Αριθμός έγκρισης/Approval number: oEL5400030
Αριθμός εγγραφής/Registration number: 22200 540 00033



Στοιχεία Παρασκευαστή: ALPHATECH - Zi du Grand Plessis - 22940 PLAINTEL (France)

Τηλ.: +(33) 296326990 - Fax: +(33) 296326999 - E-mail: contact.export@alphatech-france.eu

Αριθμός έγκρισης: oFR22171015



ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ:

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής: 44ml ανά ςωμα και ανά ημέρα, 2 εβδομάδες πριν από το τέλος της κύπρης και μερική την επιβεβαίωση της επόμενης κύπρης.
Θηλάδες και θηλές αγελάδες: 30ml ανά ςωμα και ανά ημέρα, 2 εβδομάδες πριν από το τέλος της κύπρης και μερική την επιβεβαίωση της επόμενης κύπρης.
Δαμαζέλες/δαμάδες: 19ml ανά ςωμα και ανά ημέρα, 2 εβδομάδες πριν από το τέλος της κύπρης και μερική την επιβεβαίωση της επόμενης κύπρης.
Νεαροί μόχοι, Ταΐροι: 21ml ανά ςωμα και ανά ημέρα, κατά τη διάρκεια των περιόδων αναπαραγωγής δραστηριότητας.

Απογαλακτισμένοι μόχοι, προβάτα, αιγαίς: 2,6ml ανά ςωμα και ανά ημέρα, κατά τη διάρκεια των περιόδων αναπαραγωγής δραστηριότητας.

Άλγες γαλακτοπαραγωγής: Έπιπλα ανά ςωμα και ανά ημέρα, 2 εβδομάδες πριν από το τέλος της κύπρης και μερική την επιβεβαίωση της επόμενης κύπρης.
Προβατίνες γαλακτοπαραγωγής: Έπιπλα ανά ςωμα και ανά ημέρα, 2 εβδομάδες πριν από το τέλος της κύπρης και μερική την επιβεβαίωση της επόμενης κύπρης.

Χοιρομόχοι: Βιτόρι: 21ml ανά ςωμα και ανά ημέρα, 7 ημέρες πριν και έως 3 ημέρες μετά τον τοκετό και 7 ημέρες πριν και έως 3 ημέρες μετά το ζεύγαρμα.

Ορνιθίες: Ήλικια<14 ημέρων: 850mL σε 1000 λίτρα νερού. Ήλικια>14 ημέρων: 1L σε 1000L νερού ανά ςωμα και ανά ημέρα.

Για τα βημάκια: κατά τη διάρκεια του οιστρου.

Για τα αροκίνια: κατά τη διάρκεια των περιόδων αναπαραγωγής δραστηριότητας.

Ορνιθίες ωπωπαραγωγής: 1L σε 1000L νερού ανά ςωμα και ανά ημέρα, κατά τη διάρκεια του οιστρου.

Γαλακτοπόλεις: Ήλικια<28 ημέρων: 840mL σε 1000L νερού. Ήλικια>28 ημέρων: 1L σε 1000L νερού ανά ςωμα και ανά ημέρα.

Για τα βημάκια: κατά τη διάρκεια του οιστρου.

Για τα αροκίνια: κατά τη διάρκεια των περιόδων αναπαραγωγής δραστηριότητας.

Φραγκόκοτες: 1L σε 1000L νερού ανά ςωμα και ανά ημέρα.

Για τα βημάκια: κατά τη διάρκεια του οιστρου.

Για τα αροκίνια: κατά τη διάρκεια των περιόδων αναπαραγωγής δραστηριότητας.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Συντονισμένη διάρκεια χρήσης: από 2 έως 15 ημέρες.

Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής: 44ml ανά ςωμα και ανά ημέρα.

Θηλάδες και θηλές αγελάδες: 30ml ανά ςωμα και ανά ημέρα.

Δαμαζέλες/δαμάδες: 19ml ανά ςωμα και ανά ημέρα.

Νεαροί μόχοι, Ταΐροι: 21ml ανά ςωμα και ανά ημέρα.

Απογαλακτισμένοι μόχοι, προβάτα, αιγαίς: 2,6ml ανά ςωμα και ανά ημέρα.

Άλγες γαλακτοπαραγωγής: Έπιπλα ανά ςωμα και ανά ημέρα.

Προβατίνες γαλακτοπαραγωγής: Έπιπλα ανά ςωμα και ανά ημέρα.

Γαλακτοπόλεις: Ήλικια<28 ημέρων: 840mL σε 1000L νερού. Ήλικια>28 ημέρων: 1L σε 1000L νερού ανά ςωμα και ανά ημέρα.

Ορνιθίες ωπωπαραγωγής: 1L σε 1000L νερού ανά ςωμα και ανά ημέρα.

Φραγκόκοτες: 1L σε 1000L νερού ανά ςωμα και ανά ημέρα.