

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

AviPro® ND HB1, Κόνις για εναιώρημα, Ορνίθια

1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ

Δικαιούχος - Παρασκευαστής - Συσκευαστής -
Παραγωγός υπεύθυνος για την απελευθέρωση
των παρτίδων :

Lohmann Animal Health GmbH ,
27472 Cuxhaven, Heinz - Lohmann - Str. 4, Germany

Υπεύθυνος Κυκλοφορίας:

ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
Μεσογείων 335, 15231 Χαλάνδρι
Αττική
Τηλ.: +30 213 006 5000

2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

AviPro® ND HB1

3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Σύνθεση ανά δόση:

Δραστικό συστατικό:

- τουλάχιστον $10^{6,0}$ EID₅₀ ιός ND στέλεχος Hitchner B₁

Έκδοχα:

Disodium phosphate dihydrate, Sodium dihydrogen phosphate dihydrate, Gelatin, Sucrose, Sorbitol, Water for injections.

4. ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)

Για τον εμβολιασμό των ορνιθίων και νεαρών ορνίθων κατά της νόσου Newcastle.

5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Να μην εμβολιάζονται πτηνά που νοσούν κλινικά ή είναι εξασθενημένα. Ο εμβολιασμός με ψεκάσμο θα πρέπει να αποφεύγεται σε σμήνη που έχουν μολυνθεί από *Mycoplasma gallisepticum*.

6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Δεν είναι γνωστές.

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.

7. ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

Ορνίθια

8. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Μία δόση του εμβολίου θα πρέπει να χορηγείται σε κάθε πτηνό.

Το εμβόλιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την 1η ημέρα της ζωής τους.

Δεν μπορεί να προταθεί ένα γενικευμένο σχήμα εμβολιασμού, διότι ο εμβολιασμός πρέπει να προσαρμόζεται στις ανάγκες του συγκεκριμένου σμήνους και στην τρέχουσα κατάσταση της νόσου.

Το AviPro® ND HB1 κατά προτίμηση χορηγείται στα ορνίθια κρεοπαραγωγής, και για τον αρχικό εμβολιασμό στα ορνίθια αναπαραγωγής και ωοπαραγωγής λόγω της μεγάλης ασφάλειας που διαθέτει.

α) Χορήγηση με το πόσιμο νερό:

Ο όγκος του διαλυθέντος εμβολίου θα πρέπει να είναι ισοδύναμος με αυτόν που θα καταναλώσουν τα πτηνά εντός 2 ωρών.

Το εμβόλιο πρέπει να χρησιμοποιηθεί αμέσως μετά τη διάλυση του στο πόσιμο νερό. Για την ταχεία λήψη του εμβολίου, θα πρέπει να διακοπεί η παροχή νερού στα πτηνά για 1 έως 2 ώρες.

Βεβαιωθείτε ότι τα πτηνά έχουν τη δυνατότητα άμεσης προσέγγισης στο διαλυθέν εμβόλιο.

Ο όγκος νερού που θα καταναλωθεί ποικίλλει. Για τη διαλυτοποίηση 1000 δόσεων, προτείνονται τα ακόλουθα:

ΗΛΙΚΙΑ ΠΤΗΝΟΥ (εβδομάδα ζωής)	ΟΓΚΟΣ ΝΕΡΟΥ (σε λίτρα)
1η	2 έως 5
2η έως 4η	5 έως 10
5η έως 8η	10 έως 15
9η έως 13η	15 έως 20
14η έως 19η	20 έως 25
Από την 20η	25 έως 30

β) Χορήγηση με ψεκασμό:

Η μέθοδος αυτή χορήγησης του εμβολίου προάγει και εγκαθιστά άμεση και αποτελεσματική ανοσία.

Γενικός Κανόνας: Όσο πιο λεπτό είναι το εκνέφωμα που παράγεται κατά τον ψεκασμό τόσο πιο μικρές είναι οι σταγόνες από τις οποίες συνίσταται, και το εμβολιακό εναιώρημα φθάνει βαθύτερα στο αναπνευστικό σύστημα. Η ανοσοποίηση είναι καλύτερη, η ασφάλεια μικρότερη.

Ο εμβολιασμός με ψεκασμό στην αρχή ή στις πρώτες εβδομάδες της ζωής τους θα πρέπει να εφαρμόζεται με τη μορφή μεγάλων σταγόνων σε μέγεθος, εκνεφώματος με σκοπό να εμποδίσουν τη βαθιά διείσδυση των σταγόνων στο αναπνευστικό σύστημα. Από την 3η-4η εβδομάδα της ζωής τους, το εμβόλιο μπορεί να εφαρμοσθεί με τη μορφή λεπτού εκνεφώματος. Απεσταγμένο νερό θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τον ψεκασμό. Όλα τα πτηνά θα πρέπει να υγραίνονται ικανοποιητικά. Να μην καταβρέχονται. Ο αερισμός θα πρέπει να διακόπτεται ή να μειώνεται κατά τη διάρκεια του ψεκασμού και εντός 20 έως 30 min στη συνέχεια.

Προσπαθήσετε να μην διεγείρετε τα πτηνά πολύ.

Θα πρέπει να μειώνεται η ένταση του φωτός και το βάδισμα στο χώρο πρέπει να γίνεται με αργό ρυθμό κατά τη διάρκεια του ψεκασμού.

Κατά τη διάρκεια του ψεκασμού θα πρέπει να φοράτε κατάλληλες μάσκες για την προστασία του αναπνευστικού και των οφθαλμών.

Η συσκευή θα χρησιμοποιείται μόνον για τον ψεκασμό και θα καθαρίζεται με ζεστό νερό χωρίς απολυμαντικά ή απορρυπαντικά.

Ο όγκος του νερού που είναι αναγκαίος για τη χορήγηση του εμβολίου, εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η ηλικία των πτηνών, το περιβάλλον του εκτροφείου, η θερμοκρασία, το σύστημα εφοδιασμού και εφαρμογής κατά τον ψεκασμό.

Τα συστήματα που χρησιμοποιούνται στον εμβολιασμό με ψεκασμό θα πρέπει να είναι εγκεκριμένα. Ο πίνακας που ακολουθεί δίδει μερικά παραδείγματα:

	Εμβολιασμός με εκνέφωμα από σταγόνες μεγάλου μεγέθους	Εμβολιασμός με εκνέφωμα από σταγόνες μικρού μεγέθους
Συσκευή	Πχ Gloria (jet diameter 1 mm)	Πχ Atomist 1026BR Jet adjustment: low
Μέσο μέγεθος σταγόνας	> 50 mm	< 50 mm
Όγκος / 1.000 πτηνά	500-1.000 ml	500-1.000 ml
Ροή / πίεση	500-600 ml/min 2-3 bar	100-250 ml/min
Διάρκεια ψεκασμού για 1000 πτηνά	1-2 min	Περίπου 2-5 min

9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα

Η χορήγηση του εμβολίου να γίνεται μετά τη διαλυτοποίηση του στο νερό.
Το ανασυσταθέν εμβόλιο θα πρέπει να φυλάσσεται μακριά από το φως και σε θερμοκρασία < 25°C.
Βεβαιωθείτε ότι το πόσιμο νερό είναι ελεύθερο από απολυμαντικά και απορρυπαντικά.
Το περιεχόμενο των ανοιγμένων φιαλών θα πρέπει να χρησιμοποιείται εφ' άπαξ.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ζωντανό εμβόλιο. Να μην έρχεται σε επαφή με τα δικά σας μάτια.
Οι ιοί ND είναι δυνατόν να προκαλέσουν επιπεφυκίτιδα. Κατά τον ψεκασμό να φοράτε τα κατάλληλα προστατευτικά μέσα για τα μάτια και αναπνευστικό σύστημα. Να συμβουλευτείτε τον ιατρό εάν το εμβόλιο έλθει σε επαφή με τα μάτια σας.

10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Δεν απαιτείται.

11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Φυλάσσεται σε θερμοκρασία 2 °C έως 8 °C (ψυγείο).
Το προϊόν να μην έρχεται σε απευθείας επαφή με τις ακτίνες του ήλιου και με απολυμαντικά.

12. ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)

Καμία

13. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Συμβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας για τον τρόπο απόρριψης των χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος.

14. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

15. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ:

Φιαλίδια των 1.000 δόσεων
Φιαλίδια των 2.500 δόσεων
Κουτί με 10 φιαλίδια των 1.000 δόσεων
Κουτί με 10 φιαλίδια των 2.500 δόσεων

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Αριθμός Άδειας Κυκλοφορίας: 337578/29-9-1982/K-1368

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν,
παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας.

*** χορηγείται με συνταγή κτηνιάτρου ***

**ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ
ΠΑΙΔΙΑΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793 777**