

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ:
AviPro SALMONELLA DUO
λυοφιλοποιημένο υλικό για χορήγηση με πόσιμο νερό

1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ

Lohmann Animal Health GmbH
Heinz-Lohmann-Str. 4, 27472 Cuxhaven, GERMANIA

Τοπικός Αντιπρόσωπος στην Ελλάδα:

Ελάνκο Ελλάς ΑΕΒΕ
Μεσογείων 335
152 31 Χαλάνδρι, Αττική

2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

AviPro SALMONELLA DUO
λυοφιλοποιημένο υλικό χορήγηση με πόσιμο νερό

3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Μία δόση περιέχει:

Δραστικά συστατικά:

Ζωντανά εξασθενημένα βακτήρια *Salmonella* Enteritidis, στέλεχος Sm24/Rif12/Ssq, ελάχ. 1×10^8 CFU* και μέγ. 6×10^8 CFU*

Ζωντανά εξασθενημένα βακτήρια *Salmonella* Typhimurium, στέλεχος Nal2/Rif9/Rtt, ελάχ. 1×10^8 CFU* και μέγ. 6×10^8 CFU*

*CFU = μονάδες σχηματισμού αποικιών.

Έκδοχα:

Soy peptone
Sucrose
Gelatine
Ρυθμιστικό διάλυμα HEPES

Εμφάνιση:

Λευκός-γκρίζος έως λευκός-καφέ σβόλος

4. ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)

Όρνιθες (μελλοντικοί γεννήτορες και μελλοντικές φωτόκες όρνιθες):

Για την ενεργητική ανοσοποίηση υγιών ή ευπαθών ορνίθων, ώστε να μειωθεί η απέκκριση μέσω των κοπράνων και η ανάπτυξη αποικιών στα εσωτερικά όργανα με φυσικά στελέχη *Salmonella* Enteritidis και *Salmonella* Typhimurium και για να μειωθεί η ανάπτυξη αποικιών στα αυγά με φυσικά στελέχη *Salmonella* Enteritidis.

Έναρξη ανοσίας: 15 ημέρες

Διάρκεια ανοσίας: 52 εβδομάδες έναντι του λοιμογόνου *S. Enteritidis* και 46 εβδομάδες έναντι του λοιμογόνου *S. Typhimurium* από το χρονικό σημείο του τελευταίου εμβολιασμού όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με το συνιστώμενο χρονοδιάγραμμα εμβολιασμού.

Ινδόρνιθες γεννήτορες και ινδόρνιθες κρεατοπαραγωγής:

Για την ενεργητική ανοσοποίηση υγιών ή ευπαθών ινδορνίθων, ώστε να μειωθεί ο αποικισμός εσωτερικών οργάνων με φυσικά στελέχη *Salmonella Enteritidis* και *Salmonella Typhimurium*.

Σε γενικές γραμμές, ο αποικισμός εσωτερικών οργάνων εμβολιασμένων ινδορνίθων με βακτήρια που συνιστούν πρόκληση, μειώνεται σε σύγκριση με μη εμβολιασμένες ινδόρνιθες. Στατιστικά σημαντική μείωση δεν μπόρεσε να καταδειχθεί σε όλες τις περιπτώσεις.

Έναρξη ανοσίας: 21 ημέρες μετά τον πρώτο εμβολιασμό

Διάρκεια ανοσίας: για μελλοντικούς γεννήτορες: 30 εβδομάδες έναντι του λοιμογόνου *Salmonella Enteritidis* και 28 εβδομάδες έναντι του λοιμογόνου *Salmonella Typhimurium* από το χρονικό σημείο του τελευταίου εμβολιασμού όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με το συνιστώμενο χρονοδιάγραμμα εμβολιασμού
για ινδόρνιθες κρεατοπαραγωγής: 10 εβδομάδες έναντι του λοιμογόνου *Salmonella Enteritidis* και έναντι του λοιμογόνου *Salmonella Typhimurium* από το χρονικό σημείο του τελευταίου εμβολιασμού όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με το συνιστώμενο χρονοδιάγραμμα εμβολιασμού

Πάπιες κρεατοπαραγωγής:

Για την ενεργητική ανοσοποίηση υγιών ή ευπαθών παπιών, ώστε να μειωθεί ο αποικισμός στα εσωτερικά όργανα με φυσικά στελέχη *Salmonella Typhimurium*.

Έναρξη ανοσίας: 22 ημέρες.

Διάρκεια ανοσίας: 43 ημέρες.

5. ANTENΔΕΙΞΕΙΣ

Καμία.

6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Δεν είναι γνωστή καμία.

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικά τον κτηνίατρό σας.

7. ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

Όρνιθες (μελλοντικοί γεννήτορες και μελλοντικές ωστόσο όρνιθες), ινδόρνιθες γεννήτορες και ινδόρνιθες κρεατοπαραγωγής και πάπιες κρεατοπαραγωγής από την ηλικία μίας ημέρας

8. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Για από στόματος χρήση μετά από ανασύσταση σε πόσιμο νερό

Δοσολογία και χρήση:

Πάπιες κρεατοπαραγωγής: Μία εφάπαξ δόση από την πρώτη ημέρα της ζωής.

Όρνιθες (μελλοντικοί γεννήτορες και μελλοντικές ωοτόκες όρνιθες): Μία εφάπαξ δόση από την πρώτη ημέρα της ζωής ακολουθούμενη από έναν δεύτερο εμβολιασμό σε ηλικία 6 έως 8 εβδομάδων και έναν τρίτο εμβολιασμό περίπου την 16^η εβδομάδα ζωής τουλάχιστον 3 εβδομάδες πριν από την έναρξη της ωοτοκίας.

Ινδόρνιθες κρεατοπαραγωγής: Μία εφάπαξ δόση από την πρώτη ημέρα της ζωής ακολουθούμενη από δεύτερο εμβολιασμό σε ηλικία 6 εβδομάδων.

Ινδόρνιθες γεννήτορες: Μία εφάπαξ δόση από την πρώτη ημέρα της ζωής ακολουθούμενη από δεύτερο εμβολιασμό σε ηλικία 6 εβδομάδων, τρίτο εμβολιασμό σε ηλικία 16 εβδομάδων και τέταρτο εμβολιασμό σε ηλικία 23-24 εβδομάδων.

Χορήγηση από το στόμα μέσω του πόσιμου νερού

1. Καθορισμός της απαιτούμενης ποσότητας νερού:

- Το εμβόλιο θα πρέπει να χορηγείται στην ποσότητα του νερού που καταναλώνεται από τα πτηνά εντός 3 ωρών. Χρησιμοποιήστε την καταγραφή του μετρητή νερού της προηγούμενης ημέρας, για να καθορίσετε με ακρίβεια τη σωστή ποσότητα νερού σε κάθε περίπτωση. Εναλλακτικά, η απαιτούμενη ποσότητα νερού μπορεί να υπολογιστεί με βάση τον αριθμό και την ηλικία των πτηνών σε συνδυασμό με τις πληροφορίες που παρέχονται στους πίνακες κατανάλωσης νερού από τις εταιρείες εκτροφής.
- Σε περιπτώσεις θερμών κλιμάτων και σε είδη μεγαλύτερου σωματικού βάρους, ή είδη διαφορετικά από όρνιθες, ιδιαίτερα στην περίπτωση ινδορνιθών μεγαλύτερης ηλικίας, η ποσότητα ίσως χρειαστεί να αυξηθεί για τη διασφάλιση επαρκούς πρόσληψης νερού από κάθε πτηνό

2. Επαναίωρηση του λυοφιλοποιημένου προϊόντος:

- Όλο το περιεχόμενο του φιαλιδίου θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για έναν ορνιθώνα ή σύστημα ποτίσματος, καθώς ο διαχωρισμός μπορεί να οδηγήσει σε σφάλματα δοσολογίας.
- Όλος ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για τον εμβολιασμό (αγωγοί, λάστιχα, σωλήνες, κτλ.) θα πρέπει να καθαριστεί επιμελώς και να μην φέρει κατάλοιπα απορρυπαντικών ή απολυμαντικών.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο δροσερό, καθαρό και φρέσκο νερό, κατά προτίμηση χωρίς χλώριο και ιόντα μετάλλων. Το άπαχο γάλα σε σκόνη (<1% λιπαρά) (2-4 γραμμάρια ανά λίτρο νερού) ή το άπαχο γάλα (20-40 ml ανά λίτρο νερού) μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα του πόσιμου νερού και συνεπώς και τη σταθερότητα του εμβολίου. Ωστόσο, αυτό θα πρέπει να πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 10 λεπτά πριν από την προσθήκη του εμβολίου.
- Ανοίξτε το φιαλίδιο του εμβολίου κάτω από το νερό και διαλύστε καλά. Επειδή το συμπυκνωμένο εμβόλιο είναι ελαφρώς ιξώδες, θα πρέπει να φροντίσετε, ώστε να αδειάσετε όλο το περιεχόμενο της αμπούλας και του πώματός της, ξεπλένοντάς τα μέσα στο νερό. Το διάλυμα του εμβολίου θα πρέπει να αναμιχθεί πολύ καλά για αρκετά λεπτά πριν από τη χορήγηση του.

3. Εφαρμογή του επαναιωρημένου εμβολίου:

- Αφήστε να καταναλωθεί το νερό στις ποτίστρες, ώστε η στάθμη του νερού πριν από την εφαρμογή του εμβολίου να είναι ελάχιστη. Εάν υπάρχει ακόμη νερό, πρέπει να αποστραγγίσετε τις γραμμές πριν από την εφαρμογή του εμβολίου.
- Το νερό που έχει υποστεί επεξεργασία με το εμβόλιο πρέπει να εφαρμοστεί για μέχρι 3 ώρες, φροντίζοντας ότι όλα τα πτηνά πίνουν νερό στο διάστημα αυτό. Λόγω της ποικίλης συμπεριφοράς των πτηνών στην κατανάλωση νερού, μπορεί να χρειαστεί να διακόψετε την παροχή νερού σε κάποιες τοποθεσίες πριν από τον εμβολιασμό, για να βεβαιωθείτε ότι όλα τα πτηνά θα πούν νερό κατά τη διάρκεια του εμβολιασμού.

- Μπορεί να χρειαστεί μια περίοδος δίψας μέχρι 2-3 ώρες πριν από τον εμβολιασμό, για να βεβαιωθείτε ότι κάθε πτηνό θα λάβει μια δόση του εμβολίου.
- Βεβαιωθείτε ότι τα πτηνά δεν έχουν πρόσβαση σε απλό (χωρίς εμβόλιο) νερό κατά τη διάρκεια του εμβολιασμού.

9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Πρέπει να χρησιμοποιείται όλο το περιεχόμενο των ανοικτών φιαλιδίων. Προετοιμάστε μόνο τις ποσότητες του εμβολίου που θα χρησιμοποιηθούν εντός 4 ωρών. Προστατεύστε το ανασυσταθέν εμβόλιο από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία, τον πάγο και από θερμοκρασίες άνω των 25 °C.

Τηρήστε αυτές τις οδηγίες για τη σωστή χορήγηση, ώστε όλα τα πτηνά να λάβουν τη σωστή δόση.

10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Για όρνιθες και πάπιες: κρέας, εδώδιμοι ιστοί και αυγά: 21 ημέρες.

Για ινδόρνιθες: κρέας και εδώδιμοι ιστοί:

70 ημέρες μετά τον πρώτο εμβολιασμό

49 ημέρες μετά από επανάληψη εμβολιασμού

11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.

Φυλάσσεται και μεταφέρεται σε ψυγείο (2°C - 8°C).

Μην καταψύχετε.

Φυλάσσεται προστατευόμενο από την έκθεση στον ήλιο.

Να μην χρησιμοποιείται αυτό το κτηνιατρικό προϊόν μετά από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα.

Διάρκεια ζωής μετά την ανασύσταση σύμφωνα με τις οδηγίες: 4 ώρες

12. ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)

Ειδικές προειδοποιήσεις για κάθε είδος ζώου

Στις όρνιθες, κατά την παρουσία αντισωμάτων μητρικής προέλευσης, έχει παρατηρηθεί προστασία με εμβόλιο που περιέχει *Salmonella* Enteritidis, αλλά για το συστατικό της *Salmonella* Typhimurium δεν είναι διαθέσιμη καμία πληροφορία.

Στις ινδόρνιθες δεν μελετήθηκε η επίδραση αντισωμάτων μητρικής προέλευσης.

Ο επιπολασμός των *Salmonella* Enteritidis και *Salmonella* Typhimurium σε εμπορικές μονάδες εκτροφής ινδορνίθων μπορεί να ποικίλλει σημαντικά μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το εμβόλιο θα πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε μονάδες εκτροφής ινδορνίθων με γνωστή εμφάνιση *Salmonella* Enteritidis ή *Salmonella* Typhimurium εκτός και αν εθνικά προγράμματα ελέγχου της *Salmonella* σε Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προάγουν μέτρα ελέγχου, όπως ο εμβολιασμός.

Στις πάπιες τα αντισώματα μητρικής προέλευσης ενδέχεται να επηρεάσουν την εξέλιξη της ανοσολογικής απόκρισης.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα

Να εμβολιάζονται υγιή ζώα μόνο

Δεν έχει ελεγχθεί για καλλωπιστικά και καθαρόαιμα πτηνά.

Οι εμβολιασμένες όρνιθες μπορεί να απεκκρίνουν το εμβολιακό στέλεχος *Salmonella* Enteritidis έως και 21 ημέρες και το εμβολιακό στέλεχος *Salmonella* Typhimurium έως και 35 ημέρες μετά τον εμβολιασμό.

Οι εμβολιασμένες πάπιες μπορεί να απεκκρίνουν το εμβολιακό στέλεχος *Salmonella* Enteritidis έως και 14 ημέρες και το εμβολιακό στέλεχος *Salmonella* Typhimurium έως και 28 ημέρες μετά τον εμβολιασμό.

Η απέκκριση εμβολιακών στελεχών *Salmonella* στις ινδόρνιθες είναι διαλείπουσα. Μετά από άπαξ εμβολιασμό την πρώτη ημέρα ζωής, παρατηρήθηκε διάρκεια απέκκρισης για το εμβολιακό στέλεχος *Salmonella* Enteritidis έως και την ημέρα 49 και για το εμβολιακό στέλεχος *Salmonella* Typhimurium έως και την ημέρα 63. Μετά από επανειλημμένους εμβολιασμούς, η διάρκεια απέκκρισης μειώνεται. Λόγω των περιορισμένων δεδομένων, τα αυγά εμβολιασμένων ινδορνίθων για αναπαραγωγή δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.

Το εμβόλιο μπορεί να μεταδοθεί σε ευπαθή πτηνά που έρχονται σε επαφή με τα εμβολιασμένα πτηνά. Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, τα εμβολιακά στελέχη ενδέχεται να απομονωθούν από το περιβάλλον μετά την προαναφερθείσα περίοδο, όταν χρησιμοποιούνται πολύ ευαίσθητες μέθοδοι ανίχνευσης.

Βεβαιωθείτε ότι το πόσιμο νερό είναι ελεύθερο απορρυπαντικών, απολυμαντικών και οξέων.

Τα εμβολιακά στελέχη είναι εξαιρετικά ευαίσθητα στα αντιβιοτικά που περιέχουν φθοροκινολόνη και έχουν αυξημένη ευαισθησία στην ερυθρομυκίνη, τη χλωραμφαινικόλη, τη δοξυκυκλίνη, τα απορρυπαντικά, καθώς και σε περιβαλλοντικά επιβλαβείς παράγοντες.

Η διαφοροποίηση μεταξύ των στελεχών του εμβολίου και των φυσικών στελεχών επιτυγχάνεται μέσω αντιβιογράμματος:

- *Salmonella* Enteritidis:
Σε αντίθεση με τα φυσικά στελέχη, το εμβολιακό στέλεχος είναι ευαίσθητο στην ερυθρομυκίνη (συνιστώμενη συγκέντρωση 15- 30 μg/ml) και ανθεκτικό στη στρεπτομυκίνη (συνιστώμενη συγκέντρωση 200 μg/ml) και τη ριφαμπικίνη (συνιστώμενη συγκέντρωση 200 μg/ml).
- *Salmonella* Typhimurium:
Σε αντίθεση με τα φυσικά στελέχη, το εμβολιακό στέλεχος είναι ευαίσθητο στην ερυθρομυκίνη (συνιστώμενη συγκέντρωση 15 30 μg/ml) και ανθεκτικό στο ναλιδιξικό οξύ (συνιστώμενη συγκέντρωση 20 μg/ml) και τη ριφαμπικίνη (συνιστώμενη συγκέντρωση 200 μg/ml).

Ανάλογα με το σύστημα εξέτασης που χρησιμοποιείται, ο εμβολιασμός από το στόμα ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα χαμηλές οροθετικές αντιδράσεις μεμονωμένων πτηνών σε ένα σμήνος. Επειδή η ορολογική παρακολούθηση της *Salmonella* αποτελεί μόνο εξέταση σμήνους, τα θετικά ευρήματα πρέπει να επιβεβαιωθούν, π.χ. μέσω βακτηριολογίας.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φαρμακευτικό προϊόν στα ζώα

Πρέπει να φοράτε προστατευτικό εξοπλισμό που αποτελείται από γάντια κατά το χειρισμό του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος.

Να ανοίγετε το φιαλίδιο μόνο κάτω από νερό για την αποφυγή αερολυμάτων.

Να πλένετε και να απολυμαίνετε τα χέρια σας μετά το χειρισμό του εμβολίου.

Μην το καταπιείτε. Σε περίπτωση που κατά λάθος υπάρξει κατάποση, να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια και να επιδείξετε στον ιατρό το εσώκλειστο φύλλο οδηγιών χρήσεως ή την ετικέτα του φαρμακευτικού προϊόντος.

Τα εμβολιακά στελέχη είναι ευαίσθητα σε αρκετά αντιβιοτικά, συμπεριλαμβανομένων των κινολονών (σιπροφλοξασίνη).

Δεδομένου ότι το εμβόλιο έχει προετοιμαστεί με ζωντανούς, εξασθενημένους μικροοργανισμούς, πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα, για να προλαμβάνεται η μόλυνση του χρήστη, καθώς και των άλλων προσώπων που συμμετέχουν στη διαδικασία.

Τα εμβολιασμένα ζώα μπορεί να απεκκρίνουν τα εμβολιακά στελέχη. Άτομα με ανοσοκαταστολή κρίνεται σκόπιμο να αποφεύγουν την επαφή με το εμβόλιο και τα προσφάτως εμβολιασμένα ζώα.

Το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να χορηγείται από έγκυες γυναίκες.

Το προσωπικό που ασχολείται με τη φροντίδα εμβολιασμένων ζώων πρέπει να τηρεί τις γενικές αρχές υγιεινής (αλλαγή ρουχισμού, χρήση γαντιών, καθαρισμός και απολύμανση μποτών) και να προσέχει ιδιαίτερα κατά το χειρισμό απορριμμάτων από εμβολιασμένες όρνιθες για 35 ημέρες μετά τον εμβολιασμό και από εμβολιασμένες πάπιες για 28 ημέρες μετά τον εμβολιασμό και από εμβολιασμένες ινδόρνιθες για 63 ημέρες μετά τον εμβολιασμό.

Γαλουχία:

Να μην χρησιμοποιηθεί σε όρνιθες σε περιόδους ωοτοκίας και εντός 3 εβδομάδων πριν από την έναρξη της περιόδου ωοτοκίας.

Να μην χρησιμοποιηθεί σε πάπιες που προορίζονται για ωοτοκία.

Να μην χρησιμοποιηθεί σε ινδόρνιθες σε περίοδο ωοτοκίας και εντός 5 εβδομάδων πριν από την έναρξη της περιόδου ωοτοκίας.

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης:

Εφόσον τα εμβολιακά στελέχη είναι ζωντανά βακτήρια, θα πρέπει να αποφεύγεται η ταυτόχρονη χρήση χημειοθεραπευτικών που είναι αποτελεσματικά έναντι της *Salmonella*. Ωστόσο, εάν αυτό είναι αναπόφευκτο, το σμήνος θα πρέπει να ανοσοποιηθεί ξανά. Η απόφαση για τη χορήγηση του εν λόγω εμβολίου πριν από ή έπειτα από τη χορήγηση οποιασδήποτε χημειοθεραπευτικής αγωγής θα πρέπει να λαμβάνεται κατά περίπτωση.

Δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα από τη χρήση του εν λόγω εμβολίου με οποιοδήποτε άλλο κτηνιατρικό φάρμακο. Συνεπώς, η απόφαση για τη χορήγηση του εν λόγω εμβολίου πριν ή έπειτα από τη χορήγηση οποιουδήποτε άλλου κτηνιατρικού φαρμάκου θα πρέπει να λαμβάνεται κατά περίπτωση.

Ασυμβατότητες:

Να μην αναμειγνύεται με άλλο κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν.

13. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

Ρωτήστε τον κτηνίατρό σας πώς να απορρίψετε φάρμακα που δεν χρειάζεστε. Με αυτό τον τρόπο βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος.

14. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

15. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Χάρτινο κουτί με 1 φιαλίδιο που περιέχει 1.000 δόσεις εμβολίου
Χάρτινο κουτί με 1 φιαλίδιο που περιέχει 2.000 δόσεις εμβολίου

Συσκευασίες σε πακέτα:

Χάρτινο κουτί με 10 φιαλίδια που περιέχει 1.000 δόσεις εμβολίου
Χάρτινο κουτί με 10 φιαλίδια που περιέχει 2.000 δόσεις εμβολίου

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Αριθμός Άδειας Κυκλοφορίας: 78934/15/10-11-2016

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας.