

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ:

Domitor 1 mg/ml ενέσιμο διάλυμα

1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας και παρασκευαστής υπεύθυνος για την αποδέσμευση των παρτίδων:

Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Φινλανδία

2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Domitor 1 mg/ml ενέσιμο διάλυμα
Υδροχλωρική μεδετομιδίνη

3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Κάθε ml περιέχει 1 mg υδροχλωρικής μεδετομιδίνης.

Έκδοχα:

Methyl parahydroxybenzoate (E 218)	1 mg/ml
Propyl parahydroxybenzoate (E 216)	0,2 mg/ml

4. ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)

Σκύλοι:

- Συγκράτηση, καταστολή και αναλγησία κατά τη διενέργεια κλινικών εξετάσεων και διαδικασιών, χειρουργικών επεμβάσεων μικρής έκτασης και ως αγωγή προνάρκωσης πριν την εισαγωγή και συντήρηση της γενικής αναισθησίας.
- Για καταστολή και αναλγησία σε συνδυασμό με βουτορφανόλη.
- Για καταστολή και αναλγησία σε συνδυασμό με Ι-μεθαδόνη.

Γάτες:

- Συγκράτηση, καταστολή και αναλγησία.
- Για εισαγωγή και συντήρηση της γενικής αναισθησίας πριν από χειρουργικές επεμβάσεις σε συνδυασμό με κεταμίνη.
- Για καταστολή και αναλγησία σε συνδυασμό με βουτορφανόλη, και για γενική αναισθησία σε συνδυασμό με βουτορφανόλη και κεταμίνη.
- Ως προνάρκωση πριν από αλφαζαλόνη ή αλφαδολόνη για γενική αναισθησία.

Διαδικασίες και εξετάσεις μετά από εφάπαξ χρήση δύνανται να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα χωρίς ωστόσο να περιορίζονται σε αυτά:

- Εξετάσεις: π.χ. ραδιογραφικές μελέτες
- Χειρισμός καταστάσεων: π.χ. οδοντιατρική θεραπεία, καθαρισμός ότων
- Μικρές χειρουργικές επεμβάσεις: π.χ. συρραφή τραυμάτων, εκτομή όγκων του δέρματος.

5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα με καρδιακή ανεπάρκεια, αναπνευστική νόσο ή επηρεασμένη ηπατική ή νεφρική λειτουργία, ζώα σε καταπληξία, βαρέως εξασθενημένα ζώα, ή ζώα που βρίσκονται σε στρες λόγω υπερβολικής ζέστης, κρύου ή κόπωσης.

Το Domitor δεν πρέπει να χορηγείται ταυτόχρονα με συμπαθομιμητικές αμίνες.

Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας στο δραστικό συστατικό ή σε κάποιο από τα έκδοχα.

Πριν από τη χρήση οποιωνδήποτε συνδυασμών συμβουλευθείτε τις αντενδείξεις και τις προειδοποιήσεις που αναφέρονται στο φύλλο δεδομένων του προϊόντος που χορηγείται ταυτόχρονα.

6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι πολύ σπάνιες.

Εξαιτίας της α₂-αδρενεργικής δράσης της, μπορεί να εμφανιστεί βραδυκαρδία με περιστασιακό κολποκοιλιακό αποκλεισμό. Η θερμοκρασία του σώματος είναι ελαφρώς ή μετρίως μειωμένη και παρατεταμένη ανάνηψη μπορεί να οδηγήσει σε υποθερμία. Έχει αναφερθεί κυάνωση.

Η αρτηριακή πίεση αρχικά θα αυξηθεί και στη συνέχεια θα επανέλθει στα φυσιολογικά επίπεδα ή λίγο πιο χαμηλά από τα φυσιολογικά επίπεδα.

Σε μερικούς σκύλους και στις περισσότερες γάτες παρατηρείται έμετος 5-15 λεπτά μετά τη χορήγηση. Σε μερικές γάτες μπορεί να παρατηρηθεί έμετος κατά την ανάνηψη.

Παρατηρείται αύξηση στη συγκέντρωση της γλυκόζης του αίματος λόγω της διαμεσολαβούμενης από τους άλφα-2-αδρενεργικούς υποδοχείς αναστολής της έκκρισης της ινσουλίνης.

Ούρηση συνήθως συμβαίνει κατά τη διάρκεια της ανάνηψης σε 90 με 120 λεπτά περίπου μετά τη θεραπεία.

Μερικά ζώα εκδηλώνουν μυϊκό τρόμο και μπορεί να είναι ευαίσθητα σε δυνατούς ήχους.

Έχουν αναφερθεί περιστατικά παρατεταμένης καταστολής και υποτροπής της καταστολής μετά την αρχική ανάνηψη.

Έχουν αναφερθεί μεμονωμένα περιστατικά υπερευαισθησίας, παράδοξης αντίδρασης (διέγερση) και έλλειψης αποτελεσματικότητας.

Έχει αναφερθεί θάνατος από κυκλοφορική ανεπάρκεια με σοβαρή συμφόρηση των πνευμόνων, του ήπατος, ή των νεφρών. Μπορεί να παρουσιαστεί μείωση του ρυθμού της αναπνοής με ή χωρίς περιόδους παροδικής άπνοιας. Εάν το ζώο έχει προϋπάρχουσα υποκλινική αναπνευστική νόσο, η χορήγηση του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος μπορεί να προκαλέσει ορισμένη σημαντική αναπνευστική καταστολή που θα μπορούσε να προδιαθέσει το ζώο για ανεπιθύμητες επιδράσεις, όπως καρδιακή ανακοπή. Έχει αναφερθεί πνευμονικό οίδημα.

Σε γάτες, όταν το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με κεταμίνη, τα αντανεκλαστικά του λάρυγγα και του φάρυγγα διατηρούνται κατά τη διάρκεια της αναισθησίας. Έχει αναφερθεί ότι ο συνδυασμός προκαλεί μια αντίδραση πόνου σε ορισμένες γάτες όταν χορηγείται ενδομυϊκά. Οι καρδιακοί ρυθμοί γενικώς θα μειωθούν κατά 50% περίπου σε σχέση με τα επίπεδα προ

του αναισθητικού και σε ορισμένες γάτες παρατηρούνται πολύ αργοί ρυθμοί αναπνοής (4-6 αναπνοές ανά λεπτό).

Σε σκύλους, όταν το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με προποφόλη, μπορεί να συμβεί κίνηση των εμπρόσθιων ποδιών κατά τη διάρκεια της εισαγωγής της αναισθησίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις με υψηλότερες δοσολογίες, μπορεί να προκύψει μια πτώση της τάσης του αρτηριακού οξυγόνου.

Η συχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών καθορίζεται ως ακολούθως:

- πολύ συχνή (περισσότερο από 1 στα 10 ζώα παρουσιάζουν ανεπιθύμητες ενέργειες)
- συχνή (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 100 ζώα)
- μη συνηθισμένη (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 1.000 ζώα)
- σπάνια (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 10.000 ζώα)
- πολύ σπάνια (λιγότερο από 1 στα 10.000 ζώα)

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια, ακόμα και αν δεν αναφέρεται στο εσωκλειστο Φύλλο Οδηγιών Χρήσης ή αμφιβάλλετε για την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.

7. ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

Σκύλος, γάτα.

8. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Το Domitor χορηγείται ενδομυϊκά (IM), ενδοφλέβια (IV) και υποδόρια (SC). Η δράση είναι πιο γρήγορη μετά από IV χορήγηση και βραδύτατη μετά από SC χορήγηση. Η δοσολογία εξαρτάται από το βαθμό της απαιτούμενης καταστολής και αναλγησίας.

Domitor	Δόση (mcg/kg)
Σκύλοι	10-80
Γάτες	10-150

Για καταστολή, οι μικρόσωμοι σκύλοι απαιτούν περισσότερο Domitor ανά kg σωματικού βάρους απ' ό τι οι μεγαλόσωμοι σκύλοι έτσι η δοσολογία ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας σώματος θα μπορούσε να είναι πιο ακριβής. Εάν χρησιμοποιηθεί αυτή η προσέγγιση η δοσολογία είναι 750 έως 1.000 mcg/τετραγωνικό μέτρο. Ο ακόλουθος πίνακας παρέχει τη δοσολογία για σκύλους με βάση το σωματικό βάρος.

Σωματικό βάρος (kg) IV χορήγηση	Όγκος ένεσης (ml)	Σωματικό βάρος (kg) IM χορήγηση
1,5-2,2	0,1	
2,3-3,5	0,15	1,8-2,3
3,6-5,1	0,2	2,4-3,3
5,2-6,9	0,25	3,4-4,5
7,0-9,9	0,3	4,6-6,4

10,0-14,4	0,4	6,5-9,4
14,5-19,5	0,5	9,5-12,7
19,6-25,1	0,6	12,8-16,3
25,2-31,1	0,7	16,4-20,2
31,2-37,6	0,8	20,3-24,4
37,7-44,4	0,9	24,5-28,9
44,5-55,3	1,0	29,0-36,1
55,4-71,1	1,2	36,2-46,3
71,2-88,2	1,4	46,4-57,3
88,3 +	1,6	57,4-75,8
	2,0	75,9 +

Αναισθησία:

Αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση ως αναισθητικό μέσο προνάρκωσης πριν από τη γενική αναισθησία.

Φάρμακο συνδυασμού	Δοσολογία (Σκύλοι)		Δοσολογία (Γάτες)	
	Domitor (mcg/kg)	Φάρμακο συνδυασμού (mg/kg)	Domitor (mcg/kg)	Φάρμακο συνδυασμού (mg/kg)
Προποφόλη	10-60	1-4	NA	NA
Βουτορφανόλη	10-25	0,1	50	0,4
Κεταμίνη	20-60	4	80-100	2,5-7,5
Βουτορφανόλη + Κεταμίνη	NA	NA	40-80	Βουτ: 0,1-0,4 Κετ: 1,25-5,0
Αλφαξολόνη /αλφαδολόνη	NA	NA	80	2,5-5,0
1-μεθαδόνη	20-60	0,1-0,2	NA	NA

NA= δεν υπάρχει σύσταση δόσης για το συνδυασμό.

9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Όταν χορηγείται το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, πρέπει να δίδεται η δυνατότητα στο ζώο να ξεκουράζεται σε ένα απόλυτα ήσυχο μέρος. Πριν από την έναρξη οποιασδήποτε διαδικασίας ή τη χορήγηση άλλων φαρμάκων, πρέπει να αναμένεται η επίτευξη της μέγιστης κατασταλτικής δράσης, η οποία εμφανίζεται σε 10 έως 30 λεπτά περίπου, ανάλογα με την οδό χορήγησης.

10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Δεν εφαρμόζεται.

11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.

Μην καταψύχετε.

Να μην χρησιμοποιείται αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν μετά από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο κουτί και στο φιαλίδιο μετά τη ΛΗΞΗ. Η ημερομηνία λήξεως συμπίπτει με την τελευταία ημέρα του συγκεκριμένου μήνα.

Μετά την αφαίρεση της πρώτης δόσης, χρησιμοποιήστε το προϊόν εντός 3 μηνών.

Το ελαστικό πόμα κάθε φιαλιδίου επιτρέπεται να διατηρηθεί μέχρι 20 φορές.

12. ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)

Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα

Πρέπει να πραγματοποιείται κλινική εξέταση σε όλα τα ζώα πριν από τη χρήση φαρμάκων για καταστολή και/ή γενική αναισθησία.

Σε εξαιρετικά νευρικά, ανήσυχα ή ταραγμένα ζώα, τα επίπεδα των ενδογενών κατεχολαμινών μπορεί να είναι υψηλά. Η φαρμακολογική απόκριση που προκαλείται από τους άλφα-2 αγωνιστές (π.χ., μεδετομιδίνη) σε αυτά τα ζώα είναι συχνά μειωμένη, με το βάθος και τη διάρκεια των κατασταλτικών και αναλγητικών δράσεων να κυμαίνονται από ελαφρώς μειωμένα έως ανύπαρκτα. Τα πολύ ταραγμένα ζώα πρέπει επομένως να χαλαρώνουν και να τους δίδεται η δυνατότητα να ξεκουράζονται ήσυχα πριν από τη λήψη του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος. Με το να επιτρέπεται στα ζώα να ξεκουράζονται ήσυχα για 10 έως 15 λεπτά μετά την ένεση, η απόκριση στο κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν μπορεί να βελτιωθεί.

Πρέπει να δίδεται προσοχή κατά το συνδυασμό μεδετομιδίνης με άλλα αναισθητικά ή κατασταλτικά. Η μεδετομιδίνη έχει σημαντική προστατευτική αναισθητική δράση. Η δόση του αναισθητικού πρέπει να μειώνεται αναλόγως.

Συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη θεραπεία πολύ νεαρών ζώων και ζώων μεγαλύτερης ηλικίας. Το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε σκύλους ηλικίας κάτω των 12 εβδομάδων.

Συνιστάται τα ζώα να είναι νηστικά πριν από τη χορήγηση του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος. Μετά τη θεραπεία, δεν θα πρέπει να δίνεται νερό ή τροφή στο ζώο πριν αυτό να είναι σε θέση να καταπιεί σωστά.

Τα υπό θεραπεία ζώα πρέπει να κρατούνται σε ζεστό και σταθερής θερμοκρασίας περιβάλλον κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και για 12 ώρες μετά την καταστολή.

Κατά τη διάρκεια παρατεταμένων διαδικασιών πρέπει να χορηγείται οφθαλμικό σκεύασμα σε τακτά χρονικά διαστήματα για τη λίπανση του κερατοειδούς ιδίως σε γάτες και μερικές φορές και σε σκύλους εάν τα μάτια τους παραμένουν ανοικτά.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα:

Σε περίπτωση τυχαίας κατάποσης ή αυτοένεσης, να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια και να επιδείξετε στον ιατρό το εσώκλειστο φύλλο οδηγιών χρήσεως αλλά ΜΗΝ ΟΔΗΓΕΙΤΕ, διότι μπορεί να επέλθει καταστολή ή μεταβολές στην αρτηριακή πίεση.

Να αποφεύγεται η επαφή με το δέρμα, τους οφθαλμούς ή τους βλεννογόνους.

Το εκτεθειμένο δέρμα πρέπει να ξεπλένεται αμέσως με άφθονη ποσότητα τρεχούμενου νερού.

Να αφαιρούνται τα ρούχα που έχουν μολυνθεί και είναι σε άμεση επαφή με το δέρμα.

Σε περίπτωση τυχαίας επαφής του φαρμάκου με τα μάτια, να ξεπλένονται με άφθονη ποσότητα τρεχούμενου νερού. Εάν παρουσιαστούν συμπτώματα, να αναζητήσετε ιατρική συμβουλή.

Εάν ο χειρισμός του προϊόντος γίνεται από έγκυες γυναίκες, πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να αποτραπεί η αυτοένεση καθώς έχουν παρατηρηθεί συσπάσεις της μήτρας και μειωμένη αρτηριακή πίεση του εμβρύου μετά από ακούσια συστηματική έκθεση.

Συμβουλή προς τους Γιατρούς:

Η υδροχλωρική μεδετομιδίνη είναι ένας άλφα-2 αδρενεργικός αγωνιστής. Τα συμπτώματα μετά την απορρόφηση μπορεί να περιλαμβάνουν: δόσοεξαρτώμενη καταστολή, αναπνευστική καταστολή, βραδυκαρδία, υπόταση, ξηροστομία και υπεργλυκαιμία. Έχουν επίσης αναφερθεί κοιλιακές αρρυθμίες. Τα συμπτώματα από το αναπνευστικό και το καρδιαγγειακό σύστημα πρέπει να αντιμετωπίζονται με συμπτωματική αγωγή.

Χρήση κατά την εγκυμοσύνη, τη γαλουχία ή την ωτοκία

Η ασφάλεια του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος δεν έχει αποδειχθεί κατά τη διάρκεια της κύησης ή της γαλουχίας. Δεν συνιστάται η χρήση κατά τη διάρκεια της κύησης ή της γαλουχίας.

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης

Το Domitor δεν πρέπει να χορηγείται ταυτόχρονα με συμπαθομιμητικές αμίνες. Εάν μετά τη χορήγηση του Domitor ακολουθήσει χορήγηση άλλων κατασταλτικών του κεντρικού νευρικού συστήματος, θα πρέπει να αναμένεται ενίσχυση της δράσης τους, και ως εκ τούτου η δόση τους θα πρέπει να ρυθμισθεί κατάλληλα.

Αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν είναι ένας ισχυρός άλφα-2 αγωνιστής ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή με άλλα κατασταλτικά ή αναλγητικά φάρμακα. Αθροιστικές ή συνεργιστικές δράσεις είναι πιθανές, ενδεχομένως να οδηγήσουν σε υπερδοσολογία.

Το Domitor έχει σημαντική προστατευτική αναισθητική δράση. Η δόση ουσιών όπως της προποφόλης και των πτητικών αναισθητικών πρέπει να μειώνεται ανάλογα έως και 50 – 90% με βάση το κάθε ζώο.

Παρότι η βραδυκαρδία μπορεί εν μέρει να αποτραπεί από προηγούμενη χορήγηση (τουλάχιστον 5 λεπτά πριν από το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν) ενός αντιχολινεργικού παράγοντα, η χορήγηση αντιχολινεργικών παραγόντων για την αντιμετώπιση της βραδυκαρδίας είτε ταυτόχρονα με μεδετομιδίνη ή μετά την καταστολή με μεδετομιδίνη θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεπιθύμητες καρδιαγγειακές επιδράσεις.

Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα), εάν είναι απαραίτητα

Υπερδοσολογία εκδηλώνεται κυρίως με την καθυστερημένη ανάνηψη μετά από καταστολή ή αναισθησία. Σε μερικά ζώα μπορεί να εμφανισθεί κυκλοφορική και αναπνευστική καταστολή.

Σε μελέτες ασφάλειας σε ζώα-στόχους, η μεδετομιδίνη ήταν ανεκτή σε σκύλους έως και 5 φορές τη συνιστώμενη IV δόση και έως και 10 φορές τη συνιστώμενη IM δόση. Εφάπαξ IV χορήγηση 10

φορές τη συνιστώμενη δόση σε σκύλους προκάλεσε μια παρατεταμένη κατάσταση ομοιάζουσα με αναισθησία που συνοδεύτηκε από αυξημένο επίπεδο αυτόματων μυϊκών συσπάσεων (δεσμιδώσεις). Επαναλαμβανόμενες IV δόσεις 3 ή 5 φορές τη συνιστώμενη δόση προκάλεσαν βαθιά καταστολή, βραδυκαρδία και μειωμένο ρυθμό αναπνοής επί αρκετές ώρες, που συνοδεύτηκαν σε ορισμένα ζώα από περιστασιακές αυτόματες δεσμιδώσεις. Θάνατος (περίπου 1 συμβάν στις 40.000 θεραπείες) έχει σημειωθεί στην κλινική χρήση, με δόσεις 2 φορές τη συνιστώμενη δόση του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος.

Σε περιπτώσεις υπερδοσολογίας, ή εάν οι επιδράσεις του Domitor γίνουν απειλητικές για τη ζωή του ζώου, συστήνεται χορήγηση του Antisedan στην κατάλληλη δόση με την προϋπόθεση ότι η αναστροφή της καταστολής και της αναλγησίας δεν είναι επικίνδυνη για το πάσχον ζώο. Στο σκύλο, η δοσολογία του Antisedan υπολογισθείσα σε ml είναι ίδια με εκείνη του Domitor (η δοσολογία της ατιπαμεζόλης εκφραζόμενη σε mcg είναι 5 φορές μεγαλύτερη από αυτή της μεδετομιδίνης). Στη γάτα, η δοσολογία του Antisedan σε ml είναι το ήμισυ εκείνης του Domitor (η δοσολογία της ατιπαμεζόλης εκφραζόμενη σε mcg είναι 2,5 φορές μεγαλύτερη από αυτή της μεδετομιδίνης). Το Antisedan δεν αναστρέφει τις επιδράσεις της κεταμίνης.

Λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα της κατάστασης, το ζώο μπορεί να αερίζεται με οξυγόνο και να λαμβάνει ενδοφλέβια υγρά. Είναι σημαντικό να διατηρείται η φυσιολογική θερμοκρασία του σώματος τόσο κατά την καταστολή όσο και κατά την ανάνηψη. Εάν το ζώο είναι σε υποθερμία, αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος θα επιταχύνει την ανάνηψη. Εάν είναι αναγκαίο να αναστραφεί η βραδυκαρδία αλλά να διατηρηθεί η καταστολή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ατροπίνη.

13. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Συμβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας για τον τρόπο απόρριψης των χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος.

14. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

30/05/2017

15. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Γυάλινα φιαλίδια Τύπου I (Ευρ.Φαρμ.) των 10 ml, με ασφαλές κλείσιμο με πώμα από ελαστικό βρωμοβουτυλίου και επίπωμα από αλουμίνιο.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Να διατίθεται μόνο με κτηνιατρική συνταγή.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας

ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.

Μεσογείων 335
15231, Χαλάνδρι
Αττική-Ελλάς
Τηλ. 2130065000