

Nutrient Express®

18-18-18



Ένα παντοδύναμο υδατοδιαλυτό προϊόν θρέψης για την παραγωγή εύρωστων και υψηλής απόδοσης φυτών.

ΛΙΠΑΣΜΑ ΜΕ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΦΥΚΗ (*Ascophyllum nodosum*)

Αριθμός Κυκλοφορίας: 106 /11-7-2013

Το προϊόν ανήκει στην ομάδα ΣΤ των Νέου Τύπου Λιπασμάτων:

«Ουσίες βοηθητικές της ανάπτυξης των φυτών όπως: φυτορμόνες, ένζυμα, ρυθμιστές, βιταμίνες, πρωτεΐνες, αμινοξέα και άλλες παρόμοιες ουσίες που συμβάλουν στην ανάπτυξη του φυτού και βελτιώνουν την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων, σε συνδυασμό με έναν ή και περισσότερους τύπους λιπασμάτων των ομάδων α' - δ'.»

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

ΟΛΙΚΟ ΑΖΩΤΟ (N)	18%
5,5% Νιτρικό άζωτο	
4,9% Αμμωνιακό άζωτο	
7,6% Ουρία	
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΦΩΣΦΟΡΟΣ (P ₂ O ₅)	18%
ΔΙΑΛΥΤΟ ΚΑΛΙΟ (K ₂ O)	18%
Ολικό Μαγνήσιο (Mg)	0,50%
0,50% Υδατοδιαλυτό Μαγνήσιο	
Βόριο (B)	0,02%
Χαλκός (Cu), σχηματίζει χηλικό σύμπλοκο με EDTA	0,05%
Σίδηρος (Fe), σχηματίζει χηλικό σύμπλοκο με EDTA	0,10%
Μαγγάνιο (Mn), σχηματίζει χηλικό σύμπλοκο με EDTA	0,05%
Μολυβδαίνιο (Mo)	0,001%
Ψευδάργυρος (Zn), σχηματίζει χηλικό σύμπλοκο με EDTA	0,05%

**ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ
ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ**

Παρασκευάζεται από:

Miller Chemical & Fertilizer, LLC
Hanover, Pennsylvania 17331 USA

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:

5 ΛΙΜΠΡΕΣ (2,27 ΚΙΛΑ)

Διανέμεται από:

ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε., Μεσογείων 335
152 31 Χαλάνδρι, Τηλ.: 213 006 5000



A HUBER COMPANY



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ-ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Γενική δόση: Για διαφυλλική λίπανση 200-400 γραμ. σε 100 κιλά νερό. Για τις μεταφυτεύσεις χρησιμοποιείτε 300-400 γραμ. σε 100 κιλά μεταφυτευτικό νερό. Όταν το ΝΟΥΤΡΙΕΝΤ ΕΞΠΡΕΣ σκορπίζεται με το χέρι (μεταφυτεύσεις δένδρων, σπορεία) υπολογίστε περίπου 150 γραμ. ανά δένδρο ή 15 γραμ. ανά τετρ. μέτρο. Σε όλες τις περιπτώσεις τα αποτελέσματα είναι καλύτερα όταν γίνονται 2-3 εφαρμογές κατά διαστήματα 7-14 ημερών. Όπου και όταν χρειάζεται μπορούν να γίνουν και περισσότερες εφαρμογές. Προτείνεται η εφαρμογή του ΝΟΥΤΡΙΕΝΤ ΕΞΠΡΕΣ σε όλες τις καλλιέργειες.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Συνδυάζεται με όλα σχεδόν τα χρησιμοποιούμενα εντομοκτόνα και μυκητοκτόνα. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην το χρησιμοποιείτε με βορδιγάλαιο πολτό, δινιτρικά, (π.χ. δινιτροορθοκρεζόλη, που συνήθως υπάρχει στους χειμερινούς πολτούς), ασβεστούχα (θειασβέστιο) ή πολύ αλκαλικά σκευάσματα.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Να προστίθεται στο ψεκαστικό υγρό πάντοτε τελευταίο.

Δείκτης αλατότητας: 52,32. **Ηλεκτρική αγωγιμότητα σε 100 ppm διαλύματος λιπάσματος ($\mu\text{S}/\text{cm}$ @ 20-22°C):** 102,4. **pH:** 5-7 (1% υδατικό διάλυμα 23°C)

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Αποθηκεύεται στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία του σε κανονικές θερμοκρασίες και σε μέρος ξηρό. Ο μέγιστος χρόνος αποθήκευσης υπό τις ανωτέρω συνθήκες είναι απεριόριστος. Κατά τον χειρισμό, φοράτε προστατευτική ενδυμασία και γάντια.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: Κατά τον χειρισμό φορέστε προστατευτική ενδυμασία/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. Πλυθείτε σχολαστικά μετά το χειρισμό. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια. Μην αναπνέετε ατμούς, εκνεφώματα ή σκόνη. Αποφύγετε την παρατεταμένη ή επαναλαμβανόμενη επαφή με το δέρμα. Μην το καταπίνετε. Διαχείριση υπολοίπων χημικών προϊόντων, κενών συσκευασιών και αποβλήτων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ: Γενικές οδηγίες: Να έχετε μαζί σας το δοχείο ή την ετικέτα του προϊόντος όταν καλείτε το κέντρο ελέγχου δηλητηριάσεων ή κάποιον γιατρό ή όταν πηγαίνετε για τη λήψη θεραπείας. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε με νερό για αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, αν υπάρχουν και είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευτείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά, ενώ αφαιρείτε τα μολυσμένα ρούχα και υποδήματα. Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Καλέστε γιατρό. Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Εάν δεν αναπνέει εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή, κατά προτίμηση στόμα σε στόμα. Εάν η αναπνοή είναι δύσκολη, δώστε οξυγόνο. Καλέστε γιατρό. Σε περίπτωση κατάποσης: ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Ξεπλύνετε με νερό το στόμα. Αραιώστε το περιεχόμενο του στομάχου με πόσιμο νερό. Εάν ο εμετός προκληθεί αυθόρμητα, κρατήστε το κεφάλι χαμηλότερα από το ισχίο, για να αποφευχθεί η αναρρόφηση. ΜΗ ΔΙΝΕΤΕ ΠΟΤΕ ΣΕ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΧΑΣΕΙ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ, ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ. Καλέστε αμέσως γιατρό.