

Sugar Express®

4-10-40



Ένα παντοδύναμο υδατοδιαλυτό προϊόν θρέψης για την παραγωγή εύρωστων και υψηλής απόδοσης φυτών.

ΛΙΠΑΣΜΑ ΜΕ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΦΥΚΗ (*Ascophyllum nodosum*)

Αριθμός Κυκλοφορίας: 106 /11-7-2013

Το προϊόν ανήκει στην ομάδα ΣΤ των Νέου Τύπου Λιπασμάτων:

«Ουσίες βοηθητικές της ανάπτυξης των φυτών όπως: φυτορμόνες, ένζυμα, ρυθμιστές, βιταμίνες, πρωτεΐνες, αμινοξέα και άλλες παρόμοιες ουσίες που συμβάλουν στην ανάπτυξη του φυτού και βελτιώνουν την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων, σε συνδυασμό με έναν ή και περισσότερους τύπους λιπασμάτων των ομάδων α' - δ'.»

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

ΟΛΙΚΟ ΑΖΩΤΟ (N)	4%
4,0% Νιτρικό Άζωτο	
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΦΩΣΦΟΡΟΣ (P ₂ O ₅)	10%
ΔΙΑΛΥΤΟ ΚΑΛΙΟ (K ₂ O)	40%
Ολικό Μαγνήσιο (Mg)	0,50%
0,50% Υδατοδιαλυτό Μαγνήσιο	
Θείο (S)	7,40%
Βόριο (B)	0,02%
Χαλκός (Cu), σχηματίζει χηλικό σύμπλοκο με EDTA	0,05%
Σίδηρος (Fe), σχηματίζει χηλικό σύμπλοκο με EDTA	0,10%
Μαγγάνιο (Mn), σχηματίζει χηλικό σύμπλοκο με EDTA	0,05%
Μολυβδαίνιο (Mo)	0,001%
Ψευδάργυρος (Zn), σχηματίζει χηλικό σύμπλοκο με EDTA	0,05%

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 ΚΙΛΟ

Παρασκευάζεται από:

Miller Chemical & Fertilizer, LLC
Hanover, Pennsylvania 17331 USA

Διανέμεται από:

ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε., Μεσογείων 335
152 31 Χαλάνδρι, Τηλ.: 213 006 5000



A HUBER COMPANY



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ-ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Γενική δόση: Για διαφυλλική λίπανση 200-400 γραμ. σε 100 κιλά νερό. Για τις μεταφυτεύσεις χρησιμοποιείτε 300-400 γραμ. σε 100 κιλά μεταφυτευτικό νερό. Όταν το ΣΟΥΓΚΑΡ ΕΞΠΡΕΣ σκορπίζεται με το χέρι (μεταφυτεύσεις δένδρων, σπορεία) υπολογίστε περίπου 150 γραμ. ανά δένδρο ή 15 γραμ. ανά τετρ. μέτρο. Σε όλες τις περιπτώσεις τα αποτελέσματα είναι καλύτερα όταν γίνονται 2-3 εφαρμογές κατά διαστήματα 7-14 ημερών. Όπου και όταν χρειάζεται μπορούν να γίνουν και περισσότερες εφαρμογές. Προτείνεται η εφαρμογή του ΣΟΥΓΚΑΡ ΕΞΠΡΕΣ σε όλες τις καλλιέργειες.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Συνδυάζεται με όλα σχεδόν τα χρησιμοποιούμενα εντομοκτόνα και μυκητοκτόνα. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην το χρησιμοποιείτε με βορδιγάλαιο πολτό, δινιτρικά, (π.χ. δινιτροορθοκρεζόλη, που συνήθως υπάρχει στους χειμερινούς πολτούς), ασβεστόχυα (θειασβέστιο) ή πολύ αλκαλικά σκευάσματα. **Να προστίθεται στο ψεκαστικό υγρό πάντοτε τελευταίο.**

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Δείκτης αλατότητας: 40,14. **Ηλεκτρική αγωγιμότητα σε 100 ppm διαλύματος λιπάσματος (μS/cm @ 20-22°C):** 139,4. **pH:** 5-7 (1% υδατικό διάλυμα 23°C)

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Αποθηκεύεται στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία του σε κανονικές θερμοκρασίες και σε μέρος ξηρό. Ο μέγιστος χρόνος αποθήκευσης υπό τις ανωτέρω συνθήκες είναι απεριόριστος. Κατά τον χειρισμό, φοράτε προστατευτική ενδυμασία και γάντια.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: Να φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Κατά τον χειρισμό φορέστε προστατευτική ενδυμασία/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. Πλυθείτε σχολαστικά μετά το χειρισμό. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια. Μην αναπνέετε ατμούς, εκνεφώματα ή σκόνη. Αποφύγετε την παρατεταμένη ή επαναλαμβανόμενη επαφή με το δέρμα. Μην το καταπίνετε. Διαχείριση υπολοίπων χημικών προϊόντων, κενών συσκευασιών και αποβλήτων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ: Γενικές οδηγίες: Να έχετε μαζί σας το δοχείο ή την ετικέτα του προϊόντος όταν καλείτε το κέντρο ελέγχου δηλητηριάσεων ή κάποιον γιατρό ή όταν πηγαίνετε για τη λήψη θεραπείας. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε με νερό για αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, αν υπάρχουν και είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευτείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά, ενώ αφαιρείτε τα μολυσμένα ρούχα και υποδήματα. Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Καλέστε γιατρό. Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Εάν δεν αναπνέει εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή, κατά προτίμηση στόμα σε στόμα. Εάν η αναπνοή είναι δύσκολη, δώστε οξυγόνο. Καλέστε γιατρό. Σε περίπτωση κατάποσης: ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Ξεπλύνετε με νερό το στόμα. Αραιώστε το περιεχόμενο του στομάχου με πόσιμο νερό. Εάν ο εμετός προκληθεί αυθόρμητα, κρατήστε το κεφάλι χαμηλότερα από το ισχίο, για να αποφευχθεί η αναρρόφηση. ΜΗ ΔΙΝΕΤΕ ΠΟΤΕ ΣΕ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΧΑΣΕΙ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ, ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ. Καλέστε αμέσως γιατρό.