



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤ. ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα 3 / 2 / 1999

Αριθ. Πρωτ. 88112

Ταχ. Δ/νση : Ιπποκράτους 3-5
Ταχ. Κώδικας: 101 64 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Γ. Τσιάμπα
Τηλέφωνο : 36 47 574

ΠΡΟΣ: 1) ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
Μεσογείων 335
152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
(Με απόδειξη)

2) Δ/ νσεις Γεωργίας
Εδρες τους

3) Δ/ νσεις Εμπορίου
Εδρες τους

4) Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών
Φαρμάκων

Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά

ΚΟΙΝ: Αποδέκτες Π.Δ.

ΘΕΜΑ : Χορήγηση οριστικής έγκρισης
κυκλοφορίας στο φυτοπροστατευτικό
προϊόν (φυτορρυθμιστική ουσία)
GIBGRO 20 TB.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 721 /1977 "Περί εγκρίσεως κυκλοφορίας και ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων" και ειδικότερα το άρθρο 2, παρ. 2 και το άρθρο 5, παρ. 2".
2. Τη με αριθμ. 85418/24.8.88 (ΦΕΚ 674 / Β/ 13-9-88) απόφασή μας "για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων", Κεφ. Β, παρ.1.
3. Τη με αριθμ. 83345/28-7-1988 (ΦΕΚ. 599 /24-8-88) απόφαση μας όσον αφορά " τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων " καθώς και το Π.Δ. 115/15-5-97 (ΦΕΚ. 104/Α/30-5-97).
4. Τη με αριθμό 85960/23-7-93 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμ. 8086 έγκριση κυκλοφορίας στο όμοιας μορφής και περιεκτικότητας φυτοπροστατευτικό προϊόν ACCEL 20 TB.
6. Τη με αριθμ. 3396/3-11-1998 (ΦΕΚ. 1165/τ.Β/9-11-1998) απόφαση του κ. Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας για «ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Γεωργίας στους Υφυπουργούς Γεωργίας κ.κ. Κ. Βρεττό και Π. Φουντά».
7. Τις από 6-8-97 και 25-11-98 σχετικές αιτήσεις της ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε
8. Την από 12-1-99 αίτηση της εταιρείας, με την οποία υπέβαλε τα συμπληρωματικά στοιχεία.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Χορηγούμε οριστική έγκριση κυκλοφορίας με αριθμό 8112 στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (φυτορρυθμιστική ουσία) με τα ακόλουθα στοιχεία :

1. Εμπορικό όνομα: GIBGRO.
2. Μορφή: Δισκία (TB).
3. Εγγυημένη σύνθεση : gibberrellic acid 20 % β/β
βοηθητικές ουσίες: 77,78 % β/β

4. Καθαρότητα technical, από το οποίο παρασκευάζεται, του Οίκου Amerilab Technologies ΗΠΑ: 90 % min.
5. Παρασκευαστής : AGTROL CHEMICAL PRODUCTS USA.
6. Αντιπρόσωπος : ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
7. Τυποποιητής : Amerilab Technologies, Inc.
8. Συσκευαστής : Amerilab Technologies, Inc.
9. Συσκευασία : 9 α. Είδος- Μέγεθος: Κουτί 10 δισκίων βάρους 5 γρ. το καθένα.
9 β. Υλικό: Χάρτινο κουτί εντός του οποίου τα δισκία εσωκλείονται σε καρτέλα κατασκευασμένη από στρώματα χαρτιού- αλουμινίου με εσωτερική επένδυση λεπτού πολυαιθυλενίου (LDPE και Surlyn).

10. Στόχος για τον οποίο προορίζεται - Τρόπος δράσης:
Αύξηση της καρπόδεσης, βελτίωσης της ποιότητας, πρωιμότητα της παραγωγής στις καλλιέργειες: Αμπέλι (Σουλτανίνα και Μαύρη Κορινθιακή Σταφίδα), Αγκινάρα και Σέλινο. Διεγείρει τη διαίρεση και την επιμήκυνση των κυττάρων. Δεν επιδρά στις ρίζες.
11. Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως (μέχρι απορροής).
12. Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:
Βάζουμε στο ψεκαστικό τη μισή ποσότητα νερού. Την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος. Τη διαλύουμε σε μικρή ποσότητα νερού, σε χωριστό δοχείο και το διάλυμα το ρίχνουμε στο ψεκαστικό. Ξεπλύνουμε το δοχείο και ρίχνουμε τα νερά στο ψεκαστικό. Συμπληρώνουμε στο ψεκαστικό το υπόλοιπο νερό.

13. Φάσμα δράσης:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ Δισκία / 100λ νερό	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΑΜΠΕΛΙ:			
Σουλτανίνα για επιτραπέζια	Αύξηση καρπόδεσης , πρωίμηση παραγωγής	2 - 4	α. Στην πλήρη άνθηση (1) β. Μετά 5 - 12 ημέρες
Σουλτανίνα για σταφίδα	Αύξηση του μεγέθους των ραγών	2 - 0,6	Όταν οι ράγες γίνουν 3 mm.
Κορινθιακή σταφίδα .	Μείωση ανθόρροιας & καρπόπτωση (υποκα- τάσταση χαρακώματος)	0,1 - 0,5 (2)	Στην πλήρη άνθηση
ΑΓΚΙΝΑΡΑ	Πρωίμηση & αύξηση παραγωγής	1,6 - 3,5	Όταν τα φυτά έχουν 6 - 8 φύλλα ή 10 - 12 στα φυτά ηλικίας 1 έτους . (3)
ΣΕΛΙΝΟ	Πρωίμηση & αύξηση παραγωγής & μήκους στελέχους	5 - 7	4 εβδομάδες πριν τη συγκομιδή (4)

- Παρατηρήσεις: 1. Ο πρώτος ψεκασμός να γίνεται όταν έχει πέσει το 70 % των πλιδίων. Να γίνεται καλή διαβροχή των τσαμπιών.
2. Προσθήκη 1,5 - 2 g/100 λίτρα νερού PCPA (Δ.Σ) βελτιώνει το αποτέλεσμα. PCPA να μην εφαρμόζεται σε πρέμνα ηλικίας κάτω των τριών ετών. Όταν χρησιμοποιείται PCPA να μην γίνονται θειαφίσματα 7 ημέρες πριν και 4 μετά τον ψεκασμό.
3. Γίνονται 3 ψεκασμοί , με διάστημα 15 - 20 ημέρες μεταξύ τους .
Να αυξάνεται η αζωτούχος λίπανση και το πότισμα.
4. Ο ψεκασμός να προγραμματίζεται στον αγρό κατά τμήματα ανάλογα με το

χρόνο συγκομιδής.

5. Οι ψεकाσμοί να γίνονται τις ψυχρές ώρες της ημέρας .

6. Στο ψεकाστικό να προστίθεται προσκολλητικό .

14 .Φυτοτοξικότητα: Όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του , δεν παρουσιάζει κίνδυνο για τα φυτά.

14. Συνδυαστικότητα: Δεν συνδυάζεται με αλκαλικά διαλύματα .Όταν χρησιμοποιείται σαν υποκατάστατο της χαραγής στη Σουλτανίνα και την Κορινθιακή σταφίδα μπορεί να συνδυαστεί με σκευάσματα του PCPA για βελτίωση της αποτελεσματικότητας .

16. Σημάνσεις : -

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις) : -

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO φράσεις):

RO3: Σχετικά μη τοξικό για τις μέλισσες.

19. Προφυλάξεις για τον χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις) :

S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά .

S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα , ποτά και ζωοτροφές .

S15 Φυλάτε το μακριά από θερμότητα .

S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε , μην πίνετε ή καπνίζετε .

S47/49 Διατηρείται μόνο στην αρχική συσκευασία σε θερμοκρασία ίση ή κατώτερη των 40⁰ C και μεγαλύτερη από 0⁰ C.

SY8 Πλύντε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε , πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό .

SY11 Μη μολύνετε τα νερά ύδρευσης ή άρδευσης με το φάρμακο ή με τα κενά συσκευασίας του .

ΠΡΟΣΟΧΗ : Μπορεί να προκύψει κίνδυνος για την υγεία του χρήστη, του καταναλωτή αγροτικών προϊόντων καθώς και για το περιβάλλον.

20. Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:

Σε περίπτωση ατυχήματος ακολουθείται συμπληρωματική θεραπεία .

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων : (01) 7793777 .

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (S0 φράσεις):-

22. Απαγορεύσεις (A φράσεις):-

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):

Π1: Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Σέλινο: 7 ημέρες

24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης:

Στην αρχική και κλειστή συσκευασία του σε ξηρό μέρος και σε θερμοκρασία πάνω από 0⁰ C και κάτω από 32⁰ C παραμένει σταθερό μέχρι και 2 χρόνια.

I. Κείμενο ετικέτας:

α .Να είναι σύμφωνο με το άρθρο 22 παρ. 1 του Ν. 721 /77 και με την παρούσα απόφαση.

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

II. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31-12-2003.

β. Εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, να υποβληθεί από τον κάτοχο αυτής αίτηση ανανέωσης.

Ο
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Κ. ΒΡΕΤΤΟΣ