

AMALGEROL®



ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΤΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ – ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ΦΥΤΩΝ

Περισσότερα από 40 είδη φυτικών εκχυλισμάτων, φυσικά έλαια, θαλάσσια άλγη και ένας μοναδικός συνδυασμός από φυτικούς διεγέρτες ανάπτυξης, όπως: αυξίνες, κυτοκίνινες, γιββεριλλίνες και τερπενοειδή, καθώς επίσης και οργανικός άνθρακας, συνθέτουν το **AMALGEROL**.

Τα κύρια πλεονεκτήματα του AMALGEROL

- ◆ Δημιουργία πολύ καλού ριζικού συστήματος.
- ◆ Γρηγορότερη ενεργοποίηση μικροοργανισμών εδάφους, καλύτερο ξεκίνημα καλλιέργειας
- ◆ Καλύτερη απορρόφηση θρεπτικών στοιχείων, αξιοποίηση εδαφικής υγρασίας.
- ◆ Βελτίωση ποιότητας εδάφους μετά από συνεχή χρήση.
- ◆ Φυτά ζωηρά, δυνατά, με καλύτερη εμφάνιση,
- ◆ Αντοχή των φυτών σε δύσκολες καταστάσεις
- ◆ Μακροπρόθεσμα μείωση κόστους καλλιέργειας από λίπανση – άρδευση



***Καλύτερη ποιότητα καρπών
Αύξηση παραγωγής***

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΔΟΣΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΒΑΜΒΑΚΙ	2 x 250cc /str. + 2x2Kgr 20-20-20/ 1000lt	1 ^η : πριν τα πρώτα χτένια 2 ^η : 10 - 12 ημέρες μετά	
ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ	1 x 250cc /str. + 2Kgr 20-20-20/ 1000lt	Στα 6-8 φύλλα	
ΣΙΤΑΡΙ - ΚΡΙΘΑΡΙ	1 x 250cc /str. + 2Kgr 20-20-20/ 1000lt	Μαζί με την ζιζανιοκτονία	
ΗΛΙΑΝΘΟΣ	300 - 500cc /str.	Στα 6- 8 φύλλα ή με την ενσωμάτωση του ζιζανιοκτόνου	
ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ	2 x 300 cc /str.	Στα 8-10 φύλλα ή σε συνδυασμό με εντομοκτόνα / μυκητοκτόνα	
ΑΜΠΕΛΙ	3 x 400 cc /str	Με την εμφάνιση της ανθοταξίας μέχρι το κλείσιμο της σταφύλης	Διαφυλλικά ή μέσα από το σύστημα ποτίσματος
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ	3 x 500 cc /str	1 ^η : στην πρώτη εβδομάδα μεταφύτευσης 2 ^η : 12-14 ημέρες μετά 3 ^η : 12-14 ημέρες μετά	Μέσα από το σύστημα ποτίσματος
ΠΑΤΑΤΑ	3 x 500 cc /str	1 ^η : διόγκωση στόλωνων 2 ^η : 10-12 ημέρες μετά 3 ^η : 10- 12 ημέρες μετά	Διαφυλλικά ή μέσα από το σύστημα ποτίσματος
ΚΡΕΜΜΥΔΙ ΚΑΡΟΤΟ	3 x 500 cc /str	1 ^η : μετά την πρώτη ζιζανιοκτονία στο στάδιο του μασιγίου 2 ^η : μετά την δεύτερη ζιζανιοκτονία 3 ^η : 20 ημέρες μετά	Μέσα από το σύστημα ποτίσματος
ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ	2 x 500 cc /str	1 ^η : στην πρώτη εβδομάδα μεταφύτευσης 2 ^η : 12-14 ημέρες μετά	Μέσα από το σύστημα ποτίσματος
ΜΠΙΖΕΛΙ - ΦΑΣΟΛΙ	2 x 400 cc /str.	1 ^η : πριν την άνθηση 2 ^η : 7-10 ημέρες μετά	Μέσα από το σύστημα ποτίσματος
ΦΡΑΟΥΛΑ	2 x 400 cc /str.	1 ^η : μετά την μεταφύτευση 2 ^η : πριν την άνθηση	Μέσα από το σύστημα ποτίσματος
ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ	3 x 400 cc /str	1 ^η : αρχή πτώσης πετάλων 2 ^η : πτώση πετάλων 3 ^η : εμφάνιση καρπιδίου	Διαφυλλικά μαζί με την λίπανση ή μέσα από το σύστημα ποτίσματος*
ΕΛΙΑ	3 x 400 cc /str	1 ^η : αρχή ανθοφορίας 2 ^η : εμφάνιση καρπιδίου 3 ^η : 10-12 ημέρες μετά.	Διαφυλλικά ή μέσα από το σύστημα ποτίσματος
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ	1,5 lt /str	1 ^η : 1000cc /str στην έναρξη της ανοιξιάτικης βλάστησης 2 ^η : 500cc /str στην καρπινόδεση	Διαφυλλικά ή μέσα από το σύστημα ποτίσματος
ΓΚΑΖΟΝ	1,5 lt /str.	Εφαρμογή τουλάχιστον με 100lt νερό Κάθε 4-6 εβδομάδες	Να ακολουθεί πότισμα
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΡΟΦΟΠΕΝΙΩΝ	300 cc /100 lt νερό		Μαζί με τη λίπανση*
ΝΕΕΣ ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΟΠΟΡΩΝΩΝ	2 x 500 cc/str.	1 ^η : στην αρχή της φύτευσης 2 ^η : 20 ημέρες μετά	Μέσα από το σύστημα ποτίσματος
ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ	500 cc /str + 1Kgr ΟΥΡΙΑ	Ψεκασμός πάνω στα φυτικά υπολείμματα	Να ακολουθεί όργωμα

* Πάντα να γίνεται δοκιμή συνδυαστικότητας πριν την εφαρμογή