

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ομοιόμορφος διασκορπισμός με το χέρι ή με διανομέα κοκκωδών που προσαρμόζεται στην σπαρτική φυτευτική μηχανή και ενσωμάτων.

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΧΘΡΟΙ ΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΛΑΧΑΝΙΚΑ (Παντζάρι, καρότο, κρεμμύδι, τομάτα, πεπόνι, καρπούζι (1), κουνουπίδι, λάχανο, μαρούλι, φασόλι, πιπεριά, μελιτζάνα, αγγούρι, κοβοκυθάκι, σέλινο, σπαράγγι, αγκινάρα, πράσο, μπρόκολο, μπιζέλι).
Για έντομα εδάφους: Αγροτίδα (Agrotis spp.), Προσάγγουρας (Gryllotalpa gryllotalpa), Ζάβρος (Zabrus tenebrioides), Μνησθόνθη (Melolontha melolontha), Χλωρόσας (Carabidae), Μυριάποδα με δόση 2-2,5 κιλά/στρέμμα και εφαρμογή πριν τη σπορά ή φύτεμα με διασκορπισμό και ενσωμάτωση εφ' όλης της επιφάνειας ή 1 κιλό/στρέμμα και εφαρμογή κατά τη σπορά ή φύτεμα σε γραμμές, αυθακίες ή λάκκους φυτέματος.
Για Σιδηροσκούληγκα (Agiotes spp.), Υλέμυια (ylemyia antique) με δόση 5-6 κιλά/στρέμμα και εφαρμογή πριν τη σπορά φύτεμα με διασκορπισμό και ενσωμάτωση εφ' όλης της επιφάνειας.

BAMBAKI, Για έντομα εδάφους: Αγροτίδα (Agrotis spp.), Προσάγγουρας (Gryllotalpa gryllotalpa), Ζάβρος (Zabrus tenebrioides), Μνησθόνθη (Melolontha melolontha), Χλωρόσας (Carabidae), Μυριάποδα με δόση 2-2,5 κιλά/στρέμμα και εφαρμογή πριν τη σπορά με διασκορπισμό και ενσωμάτωση εφ' όλης της επιφάνειας ή 1,5 κιλό/στρέμμα και εφαρμογή κατά τη σπορά σε γραμμές, αυθακίες ή λάκκους φυτέματος.
Για Σιδηροσκούληγκα (Agiotes spp.), Υλέμυια (Hylemya antiqua) με δόση 5-6 κιλά/στρέμμα και εφαρμογή πριν τη σπορά με διασκορπισμό και ενσωμάτωση εφ' όλης της επιφάνειας.

ΠΑΤΑΤΑ, Για έντομα εδάφους: Αγροτίδα (Agrotis spp.), Προσάγγουρας (Gryllotalpa gryllotalpa), Ζάβρος (Zabrus tenebrioides), Μνησθόνθη (Melolontha melolontha), Χλωρόσας (Carabidae), Μυριάποδα, Σιδηροσκούληγκα (Agiotes spp.), Υλέμυια (Hylemya antiqua) με δόση 2-2,5 κιλά/στρέμμα και εφαρμογή πριν τη σπορά ή φύτεμα με διασκορπισμό και ενσωμάτωση εφ' όλης της επιφάνειας ή 2 κιλά/στρέμμα και εφαρμογή κατά τη σπορά ή 2,5-3 κιλά/στρέμμα και εφαρμογή κατά το παράχωμα.

ΣΙΤΗΡΑ, (Σιτάρι, Σικάλη, Κριθάρι, Βρώμη). Για έντομα εδάφους: Αγροτίδα (Agrotis spp.), Ζάβρος (Zabrus tenebrioides) με δόση 2-2,5 κιλά/στρέμμα και εφαρμογή πριν τη σπορά με διασκορπισμό και ενσωμάτωση εφ' όλης της επιφάνειας.
Για Σιδηροσκούληγκα (Agiotes spp.) με δόση 5-6 κιλά/στρέμμα) και εφαρμογή πριν τη σπορά με διασκορπισμό και ενσωμάτωση εφ' όλης της επιφάνειας.
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ, Για έντομα εδάφους: Αγροτίδα (Agrotis spp.), Προσάγγουρας (Gryllotalpa gryllotalpa), Ζάβρος (Zabrus tenebrioides), Μνησθόνθη (Melolontha melolontha), Χλωρόσας (Carabidae), Μυριάποδα με δόση 2-2,5 κιλά/στρέμμα και εφαρμογή πριν τη σπορά ή φύτεμα με διασκορπισμό και ενσωμάτωση εφ' όλης της επιφάνειας ή 1,2 κιλά/στρέμμα και εφαρμογή κατά τη σπορά σε γραμμές, αυθακίες ή λάκκους φυτέματος.
Για Σιδηροσκούληγκα (Agiotes spp.) Υλέμυια (Hylemya antiqua) με δόση 5-6 κιλά/στρέμμα και εφαρμογή πριν τη σπορά ή φύτεμα με διασκορπισμό και ενσωμάτωση εφ' όλης της επιφάνειας.

ΖΑΧΑΡΟΥΕΥΤΛΑ, Για έντομα εδάφους: Αγροτίδα (Agrotis spp.), Προσάγγουρας (Gryllotalpa gryllotalpa), Ζάβρος (Zabrus tenebrioides), Μνησθόνθη (Melolontha melolontha), Χλωρόσας (Carabidae), Μυριάποδα με δόση 2-2,5 κιλά/στρέμμα και εφαρμογή πριν τη σπορά ή φύτεμα με διασκορπισμό και ενσωμάτωση εφ' όλης της επιφάνειας ή 1,2 κιλά/στρέμμα και εφαρμογή κατά τη σπορά σε γραμμές, αυθακίες ή λάκκους φυτέματος.
Για Σιδηροσκούληγκα (Agiotes spp.), Υλέμυια (Hylemya antiqua) με δόση 5-6 κιλά/στρέμμα και εφαρμογή πριν τη σπορά ή φύτεμα με διασκορπισμό και ενσωμάτωση εφ' όλης της επιφάνειας.
ΚΑΠΝΟΣ, Για έντομα εδάφους: Αγροτίδα (Agrotis spp.), Προσάγγουρας (Gryllotalpa gryllotalpa), Ζάβρος (Zabrus tenebrioides), Μνησθόνθη (Melolontha melolontha), Χλωρόσας (Carabidae), Μυριάποδα με δόση 2-2,5 κιλά/στρέμμα και εφαρμογή πριν το φύτεμα με διασκορπισμό και ενσωμάτωση εφ' όλης της επιφάνειας ή 1,5 κιλό/στρέμμα και εφαρμογή κατά το φύτεμα σε γραμμές, αυθακίες ή λάκκους φυτέματος.
Για Σιδηροσκούληγκα (Agiotes spp.), Υλέμυια (Hylemya antiqua) με δόση 5-6 κιλά/στρέμμα και εφαρμογή πριν το φύτεμα με διασκορπισμό και ενσωμάτωση εφ' όλης της επιφάνειας.



DI-LIGER 5 GR

Chlorpyrifhos (Χλωρπυριφος) 5 %
Κοκκώδες (GR)

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:
Chlorpyrifhos 5 % β/β, Βοηθητικές ουσίες: 94,85 % β/β

**Οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο επαφής,
στομάχου και αναπνοής,
εφαρμοζόμενο πριν ή κατά τη σπορά ή τη φύτευση,
για την καταπολέμηση εντόμων εδάφους**

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Αρ. Εγκρ. Κυκλοφορίας: 14037/02-03-2004



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

**ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ**



**ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
ΓΙΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**

**ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ

1 κιλό

**ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ
ΑΜΕΣΗ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗ ΜΕ ΕΠΙΓΕΙΑ (ΛΙΜΝΕΣ, ΠΟΤΑΜΙΑ)
Ή ΥΠΟΓΕΙΑ (ΑΝΤΛΗΣΗΣ) ΑΒΑΘΗ ΝΕΡΑ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ**

**ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:**

AGRODAN SA, Almansa 105-2o, 28040 Madrid, Spain

ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΗΣ:

INDALVA S.L., Ισπανίας

ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:

Κ.Ν. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ ΒΙ.ΠΕ.Θ Σίνδος - Θεσσαλονίκη

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

Β.Αναστασιάδης, Νίκου Παρίση 28,154 51 Νέο Ψυχικό, Τηλ:2106742719

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ:

ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.

Λ. Μεσογείων 335, ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ: 2106726381



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.Στο καρπούζι εφαρμόζεται και με δοσολογία 1 γραμ./λάκκο φύτευσης.

2.Η εφαρμογή γίνεται με διανομέα κοκκωδών που εφαρμόζεται στην σπαρτική ή φυτευτική μηχανή ή με το χέρι

3.Μετά την εφαρμογή του πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια για την πλήρη ενσωμάτωση των κόκκων που έπεσαν στα άκρα του χωραφιού.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ

Προφυτρωτική εφαρμογή:-

Πατάτα: 60 ημέρες (αν χρησιμοποιηθεί κατά το παράχωμα).

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες δόσεις και καλλιέργειες.

ΣΥΝΔΙΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Δε συνδιάζεται με άλλα σκευάσματα ή με λιπάσματα. Εφαρμόζεται μόνο του.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΕΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Διατηρήστε το στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.

Ημερομηνία λήξης: Δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: •Το δοχείο να προσταύεται από την υγρασία. •Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. •Μακριά από χαλκό, ορείχαλκο, σίδερο, λευκοσίδηρο. •Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε. •Μην ανασπνέτε τη σκόνη. •Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια. •Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή •Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. •Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου. •Σε περίπτωση πυρκαγιάς και/ή εκρήξεως, μην ανασπνέτε τους καπνούς. •Σε περίπτωση πυρκαγιάς, χρησιμοποιείτε ξηρά χημικά, διοξείδιο του άνθρακα, ψεκασμό νερού ή αερό. •Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. •Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ: •Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διαθεσή τους ως επικίνδυνα απόβλητα. •Αποφύγετε την ελευθέρωση του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δεήσιο δεδομένων ασφαλείας. •Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Η δραστική ουσία του σκευάσματος (Chlorpyrifhos) είναι παρεμποδιστή της хоπνεστεράσης. Σε περίπτωση κατάποσης ή ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε του την ετικέτα.

Αντιδοτο: Χορηγήστε ενδοφλεβίως θειική ατροπίνη σε μεγάλες δόσεις (με παρακολούθηση και οδηγίες γιατρού). Μπορεί να συνδυαστεί και με 2-PAM. Μη χορηγείτε μορφίνη ή ηρεμιστικά.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ

Κρατίστε τα παραγωγικά ζώα τουλάχιστον 21 ημέρες μακριά από την περιοχή που έγινε η εφαρμογή

Απαγορεύεται η βόσκηψη μετά τη συγκομιδή του βαμβακιού

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας. Οι κενές συσκευασίες, αφού καταστραφούν προηγούμενως με ακίσμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΗΜ.ΠΑΡ.:

ΑΡ.ΠΑΡ.: