

DURSBAN® 750 WG

Προστασία μεγάλης διάρκειας



750
WG

DURSBAN® 750 WG

Δραστική ουσία: Chlorpyrifos 75% β/β
Μορφή: Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)




Το **Dursban® 750 WG** είναι οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο με μεγάλο φάσμα δράσης. Δρα δια επαφής και στομάχου και είναι κατάλληλο για την καταπολέμηση μυζητικών και μαστικών εντόμων.

Τεχνολογία WG (wetable granules)

Πολύ μικρά τεμαχίδια
Chlorpyrifos

Ομάδα κόκκων
(0.5 - 1.0 mm)

**Dursban
750 WG**



Τεμαχίδια
(0.5 - 2 μ)

Βρέξιμοι κόκκοι
(150-800 μ)

Διάσπαση κόκκου WG vs MIC

Dursban WG

Chlorpyrifos MIC

Εξωτερικό περιβάλλον
Δραστικό στοιχείο
Διάσπαση περιβλήματος από UV's σε 1 έως 30 ώρες

Τεμαχίδια a.i.
Ξηρό περιβάλλον
Υγρό περιβάλλον


Τεμαχίδια
Chlorpyrifos WG: 0,8-01,0 μ

Μικροκάψουλες
40-50 μ

Αργή αποδέσμευση δραστικού

Μεγαλύτερη διάρκεια δράσης

Περισσότερο διαθέσιμο chlorpyrifos
σε σχέση με τα EC σκευάσματα



Ημέρες από την τελευταία επέμβαση

Χαρακτηριστικά του DURSBAN WG

- Διαθέσιμο δραστικό για μεγαλύτερο διάστημα
- Μεγαλύτερη διάρκεια δράσης
- Πιο ασφαλές στις καλλιέργειες:
Απουσία διαλυτών
- Δεν επηρεάζεται από το PH
- Μεγάλη αντοχή στο ξέπλυμα
- Εύκολο στη χρήση
- Μη ερεθιστική οσμή
- Δεν μεταφέρεται από τις μέλισσες
- Κατάλληλο για χρήση σε προγράμματα IPM

DURSBAN® 750 WG

Φάσμα Δράσης

Καλλιέργεια	Στόχοι	Δόση
ΜΗΛΟΕΙΔΗ Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά.	Καρπόκαψα, Ανθονόμος, Υπονομευτής, Σαν Ζοζέ, Βαμβακάδα, Ματόψειρα, Φυλλορύκτες, Ζεύζερα, Κόσσος, Ξυλοφάγα έντομα.	64-80 γρ./100 λίτρα νερό. Για Καρπόκαψα η δόση είναι 96 γρ. /100 λίτρα νερό.
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Δαμασκηνιά.	Ανάρσια, Βαμβακάδα, Καρπόκαψα, Φυλλοδέτες, Ζευζέρα, Κόσσος, Ξυλοφάγα έντομα.	64-80 γρ./100 λίτρα νερό. Για Καρπόκαψα και την Ανάρσια η δόση είναι 96 γρ./100 λίτρα νερό.
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Γκρέϊπ-φρουτ.	Ψευδόκοκκος, Κόκκινη ψώρα, Λεκάνιο, Ασπιδωτός, Ισέρυα, Μυτιλόμορφη ψώρα, Λοιπές ψώρες, Θρίπες, Αφίδες, Ανθοτρήτης.	64-80 γρ./100 λίτρα νερό.
ΛΑΧΑΝΙΚΑ Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα, Κρεμμύδια, Καρότο, Ραπάνια, Αγκινάρες.	Αφίδες, Θρίπες, Πράσινο σκουλήκι, Πιερίδα.	160 γρ./100 λίτρα νερό (μέγιστο 160 γρ./στρέμμα).
BAMBAKI	Πράσινο σκουλήκι, Ρόδινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Αφίδες, Θρίπες.	128 γρ./στρέμμα.
ΠΑΤΑΤΑ	Δορυφόρος, Φθοριμαία, Αφίδες.	160 γρ./στρέμμα.



Πράσινο σκουλήκι



Βαμβακάδα



Καρπόκαψα



Φυλλοδέτης

Παρατηρήσεις:

Για τις καλλιέργειες: Εσπεριδοειδή, Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα, Τομάτες, Μελιτζάνες, Πιπεριές, Αγκινάρες, οι προτεινόμενες εφαρμογές να μην γίνονται κατά τη διάρκεια της άνθησης.

DURSBAN® 750 WG



Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Εσπεριδοειδή, Μηλοειδή: 30 ημέρες

Λοιπές καλλιέργειες: 20 ημέρες

Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργητική περίοδο:

Για όλες τις καλλιέργειες: 2



Ευρωπαϊκά εναρμονισμένα MRL'S:

- Μήλο, Αχλάδι, Κυδώνι: 0,5 mg/kg
- Ροδάκινο, Νεκταρίνι, Δαμάσκηνο: 0,2 mg/kg
- Πορτοκάλι, Γκρέιπ φρουτ: 0,3 mg/kg
- Λεμόνι: 0,2 mg/kg
- Μανταρίνι: 2 mg/kg
- Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα: 0,5 mg/kg
- Καρότο: 0,1 mg/kg
- Κρεμμύδι: 0,2 mg/kg
- Αγκινάρα: 1 mg/kg
- Ραπάνι, Πατάτα, Βαμβάκι: 0,05 mg/kg



Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας : 1888/7-3-2001



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε περίπτωση κατάποσης

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.
- Πολύ τοξικό για τις μέλισσες



Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάσετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση