

Electis[®] 750 WG



Electis[®] 750 WG

Electis[®] 750 WG

Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)

Εγγυημένη σύνθεση: Zoxamide: 8,3 % (β/β)
Mancozeb: 66,7 % (β/β)
Βοηθ. ουσίες 16,4 % (β/β)

Μυκητοκτόνο επαφής για την καταπολέμηση του περονόσπορου σε πατάτα, τομάτα υπαίθρου και του περονόσπορου της αμπέλου

Xn



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

N



Επικίνδυνο για το περιβάλλον

- Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα.
- Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση όταν εισπνέεται.
- Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.
- Πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Αρ. Εγκρ. Κυκλ.: 60284/ 29-7-2010 έως 30-6-2016

Καθαρό βάρος: 900 γρ.

Κάτοχος έγκρισης: Gowan Comercio Internacional e Servicos Limitada, Avenida do Infante 50-9004-521 Funchal-Madeira-Πορτογαλία
Εργοστάσιο συσκευασίας σκευάσματος: K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΒΙ.ΠΕ.Θ., Σίνδος



Υπεύθυνος επικοινωνίας/
Διανομή:
ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
Μεσογείων 335, 15231
ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210-6726381



Electis[®] 750 WG

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Το ELECTIS 750 WG είναι μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση. Η δ.ο. zoxamide δρα εξειδικευμένα εναντίον των οωμυκτών εμποδίζοντας την κυτταρική διαίρεση. Το mancozeb δρα εμποδίζοντας τον κυτταρικό μεταβολισμό των μυκήτων σε πολλαπλά σημεία.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:
Πατάτα, τομάτα (υπαίθρου): Για την καταπολέμηση του *Phytophthora infestans*.

Δόση: 180 γρ./ στρέμμα (max).
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-100 λίτρα/ στρέμμα.
Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Προληπτικές εφαρμογές από το στάδιο που τα φυτά έχουν ύψος 15-20 εκ. Τα μεσοδιάστημα των εφαρμογών δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 10 ημέρες αλλά θα πρέπει να περιοριστούν στις 7 ημέρες όταν η πίεση της ασθένειας είναι υψηλή. Αφήστε το φύλλωμα να στεγνώσει πριν τη εφαρμογή του σκευάσματος μετά από βροχή ή πότισμα. Μην εφαρμόζετε εάν αναμένεται βροχή στις επόμενες 4 ώρες.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3
Αμύλη: Για την καταπολέμηση του *Plasmopara viticola*. Δόση: 180 γρ./ 100 λίτρα νερό (max 180 γρ/στρέμμα).

Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα/ στρέμμα.
Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Εφαρμογές με ελάχιστο μεσοδιάστημα 10 ημερών. Αφήστε το φύλλωμα να στεγνώσει πριν τη εφαρμογή του σκευάσματος μετά από βροχή ή πότισμα. Μην εφαρμόζετε εάν αναμένεται βροχή στις επόμενες 4 ώρες.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 4
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Προληπτικές εφαρμογές στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των ασθενειών και εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξή τους. Να ακολουθούνται, στις περιχές όπου εφαρμόζονται, οι συστάσεις των Γεωργικών Προεδροτήσεων.

Τρόπος εφαρμογής: Εφαρμογές με ψεκασμού φυλλώματος.
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος αναδύοντας. Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.
Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αδειάστε τελείως το δοχείο του ψεκαστικού. Ξεπλύνετε τα μηχανήματα εξωτερικά με νερό. Ξεπλύνετε το σωτηρικό του δοχείου του ψεκαστικού με καθαρό νερό συμπεριλαμβανομένων των σωληνώσεων χρησιμοποιώντας για το σκοπό αυτό το ένα τρίτο του όγκου του ψεκαστικού δοχείου. Γεμίστε το ψεκαστικό δοχείο με καθαρό νερό κατά το ήμισυ αναδύστε και αδειάστε τελείως. Επαναλάβετε την διαδικασία. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού κατά το ήμισυ με νερό, προσθέστε καθαριστικό με βάση την αμμωνία (συγκέντρωση 0,03 %) αναδύστε για 2 λεπτά και γεμίστε το ψεκαστικό με καθαρό νερό. Αφήστε το για 15 λεπτά χωρίς ανάδευση και κατόπιν αδειάστε το δοχείο με πίεση μέσα από σωληνώσεις και βραχιόνες. Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό δοχείο. Φίλτρα και μπεκ αφαιρούνται και καθαρίζονται ξεχωριστά με καθαρό νερό.

***Διαχείριση ανθεκτικότητας:** Για την αποφυγή ανάπτυξης φαινομένων ανθεκτικότητας χρησιμοποιείτε το προϊόν σύμφωνα με πρόγραμμα επεμβάσεων σύμφωνα με το οποίο το ELECTIS θα εναλλάσσεται με μυκητοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου.

***Το προϊόν είναι συμβατό για χρήση σε προγράμματα IPM.**
***Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή και η κατανάλωση αμπελόφυλλων στα οποία έχει γίνει χρήση με το φυτοπροστατευτικό προϊόν.**

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:
Πατάτες, Τομάτες: 7 ημέρες
Σταφύλια (Επιτραπέζια & Οινολογία): 28 ημέρες

Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)

Εγγυημένη σύνθεση: Zoxamide: 8,3 % (β/β)
Mancozeb: 66,7 % (β/β)
Βοηθ. ουσίες 16,4 % (β/β)

Μυκητοκτόνο επαφής για την καταπολέμηση του περονόσπορου σε πατάτα, τομάτα υπαίθρου και του περονόσπορου της αμπέλου

Xn



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

N



Επικίνδυνο για το περιβάλλον

- Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα.
- Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση όταν εισπνέεται.
- Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.
- Πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ


Αρ. Εγκρ. Κυκλ.: 60284/ 29-7-2010 έως 30-6-2016

Καθαρό βάρος: 900 γρ.

Κάτοχος έγκρισης: Gowan Comercio Internacional e Servicos Limitada, Avenida do Infante 50-9004-521 Funchal-Madeira-Πορτογαλία
Εργοστάσιο συσκευασίας σκευάσματος: K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΒΙ.ΠΕ.Θ., Σίνδος



Υπεύθυνος επικοινωνίας/
Διανομή:
ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
Μεσογείων 335, 15231
ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210-6726381



Electis[®] 750 WG

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: •Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. •Μην αναπνέετε τη σκόνη. •Να φοράτε κατάλληλα γάντια. •Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεση τους επικινδύνα απόβλητα. •Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ: Μην χορηγείτε υγρά και μην προκαλείτε εμετό εάν ο πάσχων δεν διατηρεί τις αισθήσεις του ή παρουσιάζει απασίμους.

Σε περίπτωση κατάποσης μην προκαλέσετε εμετό. Ζητήστε βοήθεια γιατρού ο οποίος θα αποφασίσει το αν θα προκληθεί εμετός ή όχι.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε τα πολύ καλά με νερό για αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής μετά από 1-2 λεπτά και συνεχίστε το ξεπλύμα για αρκετά λεπτά ακόμη. Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα συμβουλευτείτε γιατρό, κατά περίπτωση οφθαλμίατρο.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλυθείτε πολύ καλά κάτω από τρεχούμενο νερό και χρησιμοποιήστε σαπούνι. Πλύνετε τα λερωμένα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε.

Σε περίπτωση εισπνοής μετακινήθείτε στον καθαρό αέρα, συμβουλευτείτε γιατρό.

Για τα παιδιά: Φροντίδα υποστηρικτική. Ταυτόχρονη έκθεση στο αντανάκμα θα πρέπει να αποφεύγεται γιατί το mancozeb έχει δράση δυσολιγερμής. Θεραπεία συμπτωματική.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777

«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.»

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

Μη ρυπαίνεται τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Μην καθαρίζετε τον ψεκαστικό εξοπλισμό κοντά σε επιφανειακά νερά. Αποφύγετε τη μόλυνση του αγροτικού περιβάλου και των δρόμων. Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών, να αφήνεται ανέκαστη ζώνη προστασίας **20 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπρο-στατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Καύση σε εγκεκριμένες για το σκοπό αυτό εγκαταστάσεις, βάση της κείμενης νομοθεσίας. Το κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενος με σκόμιο για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης εναποτιθέεται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται, στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε δροσερό και καλά αεριζόμενο ξηρό χώρο, προστατευμένο από ακραίες θερμοκρασίες και το άμεσο ηλιακό φως.

Ημίνια παρασκευής / Αριθμός παρτίδας: Βλέπε στην επιφάνεια του κουτιού.



0114