



**Δυναμική παρουσία
στη ζιζανιοκτονία των σιτηρών**



Dow AgroSciences


Solutions for the Growing World

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ






aminopyralid



florasulam



παπαρούνα



κολλητσίδα



σινάπι

Περιγραφή Προϊόντος:


Το **LANCELOT 450WG** είναι ένα νέο διασυστηματικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο πλατυφύλλων ζιζανίων σε χειμερινά και ανοιξιάρικα σιτηρά (σκληρό και μαλακό σιτάρι, κριθάρι). Το **LANCELOT 450WG** έχει εξαιρετική αποτελεσματικότητα σε ένα ευρύ φάσμα ζιζανίων συμπεριλαμβανομένων και ζιζανίων με ανθεκτικότητα σε ALS ζιζανιοκτόνα.

Ταυτότητα Προϊόντος:

Το **LANCELOT 450WG** περιέχει δύο δραστικές ουσίες με διαφορετικό τρόπο δράσης: το **Florasulam** που ανήκει στην ομάδα των τριαζολοπυριμιδινών και το **Aminopyralid** που ανήκει στην ομάδα του πυριδινοκαρβοξυλικού οξέος. Χάρη στην ανοδική και καθοδική κίνησή του το **LANCELOT 450WG** μεταφέρεται γρήγορα στα μεριστωματικά κύτταρα των ζιζανίων δια μέσου του ξυλώδους και ηθμώδους ιστού, καταστρέφοντας έτσι σε σύντομο χρονικό διάστημα τα ζιζάνια.

Εφαρμογή στο Χωράφι:

Το **LANCELOT 450WG** εφαρμόζεται μεταφυτρωτικά όταν η καλλιέργεια βρίσκεται στα στάδια της αρχής του αδελφώματος έως και την εμφάνιση του δεύτερου κόμβου. Στα ζιζάνια εφαρμόζεται μέχρι το στάδιο των 6-8 φύλλων.



Τρόπος Εφαρμογής:

Το **LANCELOT 450WG** εφαρμόζεται στη δόση των 2,5-3,3 γρ. σκ./στρέμμα και με όγκο ψεκαστικού διαλύματος 10-40 λίτρα /στρέμμα.

- Πριν την εφαρμογή να γίνεται έλεγχος για την σωστή ρύθμιση του ψεκαστικού μηχανήματος και έλεγχος του εξοπλισμού (χρήση σωστού τύπου μπεκ, ρύθμιση της πίεσης ψεκασμού).
- Κατά την εφαρμογή να γίνεται σωστός ψεκασμός και να υπάρχει ομοιόμορφη κατανομή του ψεκαστικού υγρού στην επιφάνεια του χωραφιού.

Φάσμα Δράσης - Αποτελεσματικότητα:

Ο συνδυασμός των δύο δραστικών ουσιών του **LANCELOT 450WG** προσφέρει τη δυνατότητα στον παραγωγό να καταπολεμήσει μια σειρά από σημαντικά ετήσια και ορισμένα πολυετή πλατύφυλλα ζιζάνια.

■ Μπορεί να εφαρμοστεί σε θερμοκρασίες από 5-25°C

■ Βροχόπτωση μία ώρα μετά την εφαρμογή δεν επηρεάζει την αποτελεσματικότητά του



Παρατηρήσεις: Η προσθήκη του επιφανειοδραστικού παράγοντα **Kaytar** σε αναλογία 0,2% κατ' όγκο, αυξάνει την αποτελεσματικότητα εναντίον των ζιζανίων **πολυκόμμι** (*Polygonum aviculare*), **καπνόχορτο** (*Fumaria officinalis*) και **βερόνικα** (*Veronica haederifolia*).



στελλάρια



καψέλλα



κίρσιο

Χρονικά Διαστήματα Ασφάλειας:

Οι καλλιέργειες που μπορούν να ακολουθήσουν την εφαρμογή του **LANCELOT 450WG** είναι:

- Αμέσως μετά τη συγκομιδή (3-4 μήνες): χειμερινά σιτηρά, αραβόσιτος, σόργο.
- Την επόμενη άνοιξη (12 μήνες μετά): ανοιξιότικα σιτηρά, κρεμμύδια, ηλιάνθος, βαμβάκι, τομάτα, πατάτα, τεύτλα, μηδική, καρότο, μαραθο.
- **Περισσότερο από 14 μήνες: φακές, ρεβύθια, σόγια, φασόλι, μπιζέλι.**

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε προσεκτικά την ετικέτα του προϊόντος.

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ), όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

Ευαίσθητα:

- Ανθεμίδα (*Anthemis arvensis*)
- Αναρριχώμενο πολύγωνο (*Bilderdykia convolvulus*)
- Καψέλλα (*Capsella bursa-pastoris*)
- Κίρσιο (*Cirsium arvense*)
- Μεγαλόκαρπη Κολλητσίδα (*Gallium aparine*),
- Παπαρούνα (*Papaver rhoeas*)
- Ραπανίδα (*Raphanus raphanistrum*),
- Άγριο σινάπι (*Sinapis arvensis*)
- Στελλάρια (*Stellaria media*)

Μετρίως ευαίσθητα:

- Αγριομαργαρίτα (*Chrysanthemum segetum*)
- Καπνόχορτο (*Fumaria officinalis*)
- Χαμομήλι (*Matricaria chamomilla*)
- Πολυκόμμι (*Polygonum aviculare*)
- Βερόνικα (*Veronica haederifolia*)



- **Νέο μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο της Dow AgroSciences**
- **Εξαιρετική καταπολέμηση σημαντικών και δυσκολοεξόντωτων πλατύφυλλων ζιζανίων σε σιτάρι και κριθάρι**
- **Ταυτόχρονη ύπαρξη δύο διαφορετικών δραστικών ουσιών - ισχυρό όπλο στη διαχείριση ανάπτυξης ανθεκτικότητας**
- **Αποτελεσματικότητα σε πλατύφυλλα ζιζάνια με ανθεκτικότητα σε ALS ζιζανιοκτόνα**
- **Μεγάλο εύρος εφαρμογής, με αποτέλεσμα ο ψεκασμός να γίνεται κάτω από τις καλύτερες συνθήκες ανάπτυξης της καλλιέργειας**
- **Μικρή δόση εφαρμογής ανά στρέμμα**

Αρ. Εγκρ. Κυκλ.: 7985/4-5-2012



Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιδράσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο.
Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης.



01/2013



Dow AgroSciences

Solutions for the Growing World

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ

ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΑΘΗΝΑ: Μεσογείων 335, 152 31 Χαλάνδρι
Τηλ.: 213 0065000 ΘΕΣ/ΚΗ: Τηλ.: 2310 289100
E-mail: contact@elanco.gr, www.elanco.gr

