

ΝΟΥΤΡΙΛΗΦ 60 20-20-20

ΛΙΠΑΣΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΚ

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΜΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΧΗΛΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΔΤΑ

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

ΟΛΙΚΟ ΑΖΩΤΟ (N)	20%
6,0% Νιτρικό άζωτο	
5,2% Αμμωνιακό άζωτο	
8,8% Ουρία	
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΦΩΣΦΟΡΟΣ (P ₂ O ₅)	20%
ΔΙΑΛΥΤΟ ΚΑΛΙΟ (K ₂ O)	20%
Το NUTRI-LEAF είναι εμπλουτισμένο και με ιχνοστοιχεία προσδίδοντάς του έτσι ιδιότητες πλήρους λιπάσματος.	
Περιέχει:	
Μαγνήσιο (Mg), σχηματίζει χηλικό σύμπλοκο με EDTA	0,0251%
Βόριο (B)	0,02%
Χαλκός (Cu), σχηματίζει χηλικό σύμπλοκο με EDTA	0,05%
Σίδηρος (Fe), σχηματίζει χηλικό σύμπλοκο με EDTA	0,10%
Μαγγάνιο (Mn), σχηματίζει χηλικό σύμπλοκο με EDTA	0,05%
Μολυβδαίνιο (Mo)	0,001%
Ψευδάργυρος (Zn), σχηματίζει χηλικό σύμπλοκο με EDTA	0,05%

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Το NUTRI-LEAF συνδυάζεται με όλα σχεδόν τα χρησιμοποιούμενα εντομοκτόνα και μυκητοκτόνα. Δεν συνδυάζεται με βορδιγάλειο πολτό, δινιτρικά (π.χ. δινιτροροθκορεζόλη, που συνήθως υπάγεται στους χειμερινούς πολτούς), ασβεστόχυα (θειασβέστιο) ή πολύ αλκαλικά σκευάσματα.

Να προστίθεται στο ψεαστικό υγρό πάντοτε τελευταίο.

Συνδυάζεται με ΝΟΥ ΦΙΑΜ Π και ΝΟΥ ΦΙΑΜ 17.

ΔΟΣΕΙΣ: Γενική δόση: Για διαφυλλική λίπανση 200-400 γραμ. NUTRI-LEAF σε 100 κιλά νερό. Για υδρολίπανση 2-4 κιλά ανά στρέμμα. Για τις μεταφυτεύσεις χρησιμοποιείτε 300-400 γραμ. σε 100 κιλά μεταφυτευτικό νερό. Όταν το NUTRI-LEAF σκορπίζεται με το χέρι (μεταφυτεύσεις δένδρων, σπορεία) υπολογίστε περίπου 150 γραμ. ανά δένδρο ή 15 γραμ. ανά τετρ. μέτρο.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ-ΜΗΛΟΕΙΔΗ-ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ-ΑΜΠΕΛΙΑ: Εφαρμόζεται νωρίς την άνοιξη, όταν αρχίζει η βλάστηση ή όποτε υπάρχει ανάγκη. Γίνονται 2-3 εφαρμογές. ΝΤΟΜΑΤΕΣ-ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ-ΠΕΠΟΝΙΑ-ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ-ΦΑΣΟΛΙΑ-ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ-ΠΙΠΕΡΙΕΣ κ.λ.π. Η πρώτη εφαρμογή γίνεται όταν τα φυτά είναι 3-4 εβδομάδων. Οι επόμενες εφαρμογές γίνονται κατά διαστήματα 7-10 ημερ. ΠΑΤΑΤΕΣ: Εφαρμόζεται όταν τα φυτά είναι νεαρής ηλικίας. Οι εφαρμογές συνεχίζονται όταν τα πατατόφυτα σχηματίζουν τους κονδύλους και έχουν μεγάλες απαιτήσεις. ΚΑΠΝΟΣ: Εφαρμόζεται όταν τα φυτά είναι νεαρά. Για σπορεία διαλύουμε 2 κιλά σε 400 κιλά νερό και ποτίζουμε με το συνηθισμένο τρόπο. Στις μεταφυτεύσεις η δόση είναι 150 γραμ. σε 100 κιλά μεταφυτευτικό νερό. ΣΙΤΗΡΑ-ΒΑΜΒΑΚΙΑ-ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΑ-ΑΡΑΧΙΔΕΣ: Γίνονται 1-5 εφαρμογές. ΜΑΡΟΥΛΙΑ-ΑΝΤΙΔΙΑ-ΡΑΔΙΚΙΑ-ΣΤΑΝΑΚΙΑ κ.λπ.: Εφαρμόζεται αφού τα φυτά έχουν εγκατασταθεί καλά δηλ. περίπου μετά την 3η εβδομάδα. Μεσολαβούν διαστήματα 10 ημερών. ΛΑΧΑΝΑ-ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑ: Εφαρμόζεται όπως και στην προηγούμενη περίπτωση. Επίσης και κατά τις μεταφυτεύσεις στη δόση: 2 κιλά στα 400 κιλά μεταφυτευτικό νερό. ΚΑΡΟΤΑ-ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ: Εφαρμόζεται στη δόση 1,2-1,5 κιλά NUTRI-LEAF για 1 στρέμμα. ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΕΣ-ΓΗΠΕΔΑ ΓΚΟΛΦ κ.λπ.: Εφαρμόζεται κάθε μήνα κάνοντας έναρξη Φλεβάρη ή Μάρτη. Η δόση είναι 4 κιλά διαλυμένο σε 800 κιλά νερό για 1 στρέμμα ή ½ κιλό διαλυμένο σε 100 κιλά νερό για 100 τετρ. μέτρα. Όπου ο χλοοτάπητας σκιάζεται η δόση αυξάνεται κατά 50%. Αν κανείς επιθυμεί χρώμα και ανάπτυξη κυρίως σε Bermuda και Zoysia, κάνει συχνότερες εφαρμογές. ΦΙΛΟΔΕΝΔΡΑ-ΓΕΡΑΝΙΑ-ΓΑΡΔΕΝΙΕΣ-ΚΟΛΕΟΙ-ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΕΤΤΕΣ: Εφαρμόζεται 2 φορές το μήνα στο φύλλωμα ή σε ριζοποτίσματα. Η δόση είναι 3 γραμ. σε 1 λίτρο νερό. Ειδικά για τις Αφρικανικές Βιολέττες γίνονται μόνο ριζοποτίσματα με την ίδια δόση. ΦΥΤΩΓΙΑ-ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ: Αν θέλετε να κάνετε μεταφυτευτικό υγρό για να βουτάτε τις ρίζες των φυτών προσθέστε σε ένα δοχείο των 10 λίτρων περίπου, που περιέχει υγρή λάσπη, 120 γραμ. NUTRI-LEAF και ανακατέψτε καλά. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΑΘΗΚΕΥΣΗΣ: Αποθηκεύεται στην αρχική απαριθμητή συσκευασία του σε κανονικές θερμοκρασίες και σε μέρος ξηρό. Ο μέγιστος χρόνος αποθήκευσης υπό τις ανωτέρω συνθήκες είναι απεριόριστος.

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: 1 ΚΙΛΟ

Παράγεται και συσκευάζεται στις ΗΠΑ από
MILLER CHEMICAL & FERTILIZER CORPORATION
Hanover, Pennsylvania 17331 USA



Διανομή:
ELANKO ELIAS A.E.B.E.
Α. Μεσσηγιών 335 Χαλάνδρι, Αθήνα - Τηλ: 210 6726381