



Το Millerplex 3-3-3:

- Περιέχει φυσικά εκχυλίσματα θαλάσσιων φυκών (*Ascophyllum nodosum*).
- Χρησιμοποιείται σε όλες τις καλλιέργειες, κυρίως σαν πηγή φυσικών φυτορρυθμιστικών και βιοδιεγερτικών ουσιών, θρεπτικών στοιχείων και ιχνοστοιχείων.
- Ενισχύει το μεταβολισμό του φυτού για τη σύνθεση των σακχάρων, πρωτεϊνών και όλων των συστατικών που θα μεταναστεύσουν στους καρπούς και γενικά στα εδώδια μέρη βελτιώνοντας και αυξάνοντας την παραγωγή.
- Υποκινεί τον σχηματισμό ανθοφόρων οφθαλμών.
- Παρεμποδίζει τη γήρανση των φύλλων και έτσι το φύλλο παραμένει ενεργό και φωτο-συνθέτει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα συμβάλλοντας στην καλύτερη θρέψη του φυτού.
- Εμπρεάζει τη βιοσύνθεση άλλων φυσικών φυτορρυθμιστικών ουσιών με άμεσες θετικές επιπτώσεις στην παραγωγή.
- Ενεργοποιεί το αμυντικό σύστημα του φυτού (Σύστημα Επίκτητης Ανθεκτικότητας) για την αντιμετώπιση των διαφόρων καταπονήσεων που προέρχονται από περιβαλλοντικά ή παθολογικά αίτια.
- Παρατείνει τη μετασυλλεκτική ζωή των διαφόρων φρούτων και λαχανικών.
- Αυξάνει την αναπνευστική δραστηριότητα των σπόρων και συνεπώς το ποσοστό βλάστη-σής τους.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήμα-τος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Δείκτης αλατότητας: 4,99

Ηλεκτρική αγωγιμότητα σε 100 ppm διαλύματος λιπάσματος (μS/cm @ 20-22°C): 18,9
pH: 5-7

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Το σκεύασμα συνδυάζεται με τα περισσότερα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και διαφυλλικά λιπάσματα.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Αποθηκεύεται στην αρχική απαριθμίστη συσκευασία του σε κανονικές θερμοκρασίες και σε μέρος ξηρό. Ο μέγιστος χρόνος αποθήκευσης υπό τις ανωτέρω συνθήκες είναι απεριόριστος. Κατά τον χειρισμό, φοράτε προστατευτική ενδυμασία και γάντια.



ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΘΡΕΨΗΣ με φυσικά εκχυλίσματα θαλάσσιων φυκών (*Ascophyllum nodosum*)

Εγγυημένη σύνθεση:

ΟΛΙΚΟ ΑΖΩΤΟ (N) 3%
Ουρία 3%
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΦΩΣΦΟΡΟΣ (P₂O₅) 3%
ΔΙΑΛΥΤΟ ΚΑΛΙΟ (K₂O) 3%

Αριθμός Κυκλοφορίας: 106

ΟΡΓΑΝΟΑΝΟΡΓΑΝΟ ΛΙΠΑΣΜΑ με θαλάσσια φύκη

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Miller Chemical & Fertilizer Corporation
P.O. Box 333, Radio Road, Hanover, Pennsylvania 17331, ΗΠΑ
Τηλ.: 717 632 8921, Fax: 717 632 4581
Αντιπρόσωπος για την Ελλάδα: LANCES LINK ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ
Χέυδεν 15, 104 34 Αθήνα, Τηλ./Fax: 210 55 78 797



Διανομέας:
ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
Λ. Μεσογείων 335 Χαλάνδρι,
Αθήνα
Τηλ.: 210 67 26 381



ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1LT

Τρόπος εφαρμογής - Δοσολογία:

Διαφυλλική εφαρμογή: 40-100 ml ανά στρέμμα

Υδρολίπανση: 100-200 ml ανά στρέμμα

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΔΟΣΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Αμπέλι	30-50 ml/στρ.	Γενικά με όλες τις διαφυλλικές εφαρμογές προϊόντων θρέψης ή φυτοφαρμάκων. Εφαρμογή με όλα τα ψεκαστικά μίγματα γιββερελλίνης.
Βαμβάκι	20 ml/στρ. 30-50 ml/στρ. 40-60 ml/στρ.	Γραμμική εφαρμογή στο στάδιο 1-3 φύλλα. Σχηματισμός χτενιών. Στην αρχή και στο τέλος της ανθοφορίας.
Δενδροκομία	50-120 ml/στρ.	1. Στην εμφάνιση οφθαλμών για αύξηση της επικονίασης. (Το MILLERPLEX δεν είναι επικίνδυνο για τις μελισσες ή άλλους επικονιαστές). 2. 1 εβδομάδα μετά την πτώση των πετάλων για προώθηση της κυτταρικής διαίρεσης. 3. 1-2 εβδομάδες πριν την καρπώπιση για μείωση του φυσιολογικού στρες και της καρπώπισης. 4. 20-30 ημέρες μετά την πτώση των πετάλων για αύξηση του μεγέθους του καρπού. 5. Ανά μήνα κατά τη διάρκεια ανάπτυξης του καρπού για προώθηση της κατανόμησης των θρεπτικών στοιχείων για μεγαλύτερους και ποιοτικούς καρπούς.
Σπαράγγι	90 ml/στρ. 50 ml/στρ.	Ψεκασμός στη βλάστηση 2 εβδομάδες μετά την τελευταία συγκομιδή. Ψεκασμός ανά μήνα κατά τη διάρκεια της βλαστικής ανάπτυξης.
Πατάτα	40 ml/στρ. 50 ml/στρ.	Έναρξη του σχηματισμού των κονδύλων. 4-6 εβδομάδες αργότερα.
Πιπεριά, Μελιτζάνα	20-40 ml/στρ. 30-60 ml/στρ.	3-5 φύλλα. Ανά 7-14 ημέρες για συνολικά 4-6 εφαρμογές.
Τομάτο	20-30 ml/στρ. 30-40 ml/στρ. 40-60 ml/στρ.	1 εβδομάδα μετά τη μεταφύτευση ή 6-8 φύλλα. 3 εβδομάδες αργότερα. Ανά 14 ημέρες μαζί με ασβέστιο ή διαφυλλικό λίπασμα.
Βιομηχ. τομάτα	20 ml/στρ. 40-50 ml/στρ.	1 εβδομάδα μετά τη μεταφύτευση ή 6-8 φύλλα. Έναρξη ανθοφορίας και επανάληψη 2 εβδομάδες αργότερα.
Φρέουλα	40-60 ml/στρ.	2-3 εβδομάδες πριν τη διακοπή λήθαργου. Έναρξη ανθοφορίας και επανάληψη ανά 14 ημέρες.

Στις καλλιέργειες: Δημητριακά, καλαμπόκι, καρότα, λαχανόφυτα, κρεμμύδι, σκόρδο, μηδική, μπρόκολο, λάχανο, κουνουπίδι, σέλινο, ρύζι, σόγια, σπανάκι, μαρούλι, φασόλια: δόση 30-60 ml/στρέμμα.

Καλλωπιστικά-Ανθοκομία: δόση 50-100 ml/στρέμμα