

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα ποτά και ζωοτροφές. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα. Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. "Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτικά γάντια και κατάλληλες μπότες εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό". Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους ως επικίνδυνα απόβλητα. Αποφύγετε τη ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες /δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Εάν ο ερεθισμός παραμένει ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση εισπνοής: Απομακρύνετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Κρατήστε τον παθόντα ξεστό και σε ηρεμία. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε αμέσως το στόμα και κατόπιν πιείτε άφθονο νερό, ζητήστε ιατρική βοήθεια. Μην προκαλέσετε εμετό γιατί υπάρχει κίνδυνος εισρόφησης εκτός εάν υπάρχει συμβουλή γιατρού. Ποτέ μην προκαλείτε εμετό ή χορηγείτε τίποτα από στόματος αν ο ασθενής είναι αναίσθητος ή έχει σπασμούς.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει αντιδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 2107793777

«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης».

ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μίαν αψέκαστη ζώνη προστασίας **20 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΑΓΡΟΣΤΩΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΩΝ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ: Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά), Ακρόδρυα (Αμυγδαλιά, Καρυδιά, Φουντουκιά), Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά), Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Κερασιά), Αμπέλι, Καρότο, Κρεμμύδι, Σκόρδο, Τομάτα, Πιπεριά, Μαρούλι, Αρακάς, Φασολάκια νωπά, Όσπρια (Φασόλι), Ηλιάνθος, Σόγια, Βαμβάκι, Πατάτα, Σιτάρι, Αραβόσιτος, Καπνός, Καλλωπιστικά.



Αρ. Παρτίδας:
Ημ. Παρασκευής: Βλέπε φιάλη
Ημ/νια Λήξης:

MOST MICRO 365 CS

Pendimethalin (πεντιμεθαλίν)

Εναιώρημα μικροκαψυλίων (CS)

Εγγυημένη σύνθεση: Pendimethalin: 36,5% β/ο
βοηθητικές ουσίες: 64,02% β/β

Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ



Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα. Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκασίμο.



Πολύ τοξικό για υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Αρ. Έγκρ. Κυκλοφορίας:
7951/1-3-2011 έως 31-12-2013
Κάτοχος της έγκρισης / Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση / Εργοστάσιο παρασκευής - συσκευασίας σκευάσματος: SIPCAM SpA. Ιταλία
Υπεύθυνος επικοινωνίας:
SIPCAM HELLAS Sp. Ltd.
Ήρας 3, 19400 Κορωπί, Αττικής
Τηλ.: 210 5223834

Περιεχόμενο: **1 λίτρο**



Διανομή:
ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε
Λ. Μεσογείων 335 Χαλάνδρι, Αθήνα
Τηλ: 210 6726381

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων. Στο βιοχημικό επίπεδο επηρεάζει τη λειτουργία της μίτωσης με παρεμπόδιση του σχηματισμού των μικροσωληνίσκων της μιτωτικής τράκτου.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά): Δόση 250-300 κ.εκ.σκ./στρ. Κατευθυνόμενος ψεκασμός προφυτρωτικά των ζιζανίων μεταξύ των γραμμών φύτευσης την άνοιξη ή το φθινόπωρο χωρίς να βρέχονται τα πράσινα μέρη των δένδρων.
Ακρόδρυα (Αμυγδαλιά, Καρυδιά, Φουντουκιά): Δόση 250-300 κ.εκ.σκ./στρ. Κατευθυνόμενος ψεκασμός προφυτρωτικά των ζιζανίων μεταξύ των γραμμών φύτευσης το χειμώνα (πριν την έναρξη της βλάστησης).
Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά): Δόση 250-300 κ.εκ.σκ./στρ. Κατευθυνόμενος ψεκασμός προφυτρωτικά των ζιζανίων μεταξύ των γραμμών φύτευσης το χειμώνα (πριν την έναρξη της βλάστησης).
Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Κερασιά): Δόση 250-300 κ.εκ.σκ./στρ. Κατευθυνόμενος ψεκασμός προφυτρωτικά των ζιζανίων μεταξύ των γραμμών φύτευσης το χειμώνα (πριν την έναρξη της βλάστησης).
Αμπέλι: Δόση 250-300 κ.εκ.σκ./στρ. Κατευθυνόμενος ψεκασμός προφυτρωτικά των ζιζανίων μεταξύ των γραμμών φύτευσης το χειμώνα (πριν την έναρξη της βλάστησης).
Καρότο: Δόση 200-250 κ.εκ.σκ./στρ. Προφυτρωτικά της καλλιέργειας.
Κρεμμύδι, Σκόρδο: Δόση 100-250 κ.εκ.σκ./στρ. Προφυτρωτικά ή μεταφυτρωτικά της καλλιέργειας (στο στάδιο των 2-3 φύλλων).
Τομάτα, Πιπεριά: Δόση 125-220 κ.εκ.σκ./στρ. Πριν τη μεταφύτευση.
Μαρούλι: Δόση 150-200 κ.εκ.σκ./στρ. Πριν τη μεταφύτευση.
Αρακάς: Δόση 170-250 κ.εκ.σκ./στρ. Προφυτρωτικά της καλλιέργειας.
Φασολάκια νωπά: Δόση 170-250 κ.εκ.σκ./στρ. Προφυτρωτικά της καλλιέργειας.
Όσπρια (Φασόλι): Δόση 170-250 κ.εκ.σκ./στρ. Προφυτρωτικά της καλλιέργειας.
Ηλιάνθος: Δόση 200-300 κ.εκ.σκ./στρ. Προφυτρωτικά της καλλιέργειας.
Σόγια: Δόση 200-250 κ.εκ.σκ./στρ. Προφυτρωτικά της καλλιέργειας.
Βαμβάκι: Δόση 200-300 κ.εκ.σκ./στρ. Προσπαρτικά με ενσωμάτωση ή προφυτρωτικά της καλλιέργειας.
Πατάτα: Δόση 170-300 κ.εκ.σκ./στρ. Προφυτρωτικά της καλλιέργειας.
Σιτάρι: Δόση 170-300 κ.εκ.σκ./στρ. Προφυτρωτικά της καλλιέργειας.
Αραβόσιτος: Δόση 200-300 κ.εκ.σκ./στρ. Προφυτρωτικά της καλλιέργειας.
Καπνός: Δόση 125-300 κ.εκ.σκ./στρ. Πριν τη μεταφύτευση.
Καλλωπιστικά: Δόση 250-300 κ.εκ.σκ./στρ. Κατευθυνόμενος ψεκασμός προφυτρωτικά των ζιζανίων μεταξύ των γραμμών φύτευσης μετά τη μεταφύτευση, σε καλά εγκατεστημένες φυτείες.

Στόχος: Για όλες τις καλλιέργειες του πεδίου εφαρμογής ο στόχος είναι: **Ετήσια ζιζάνια*** (αγρωστώδη και πλατύφυλλα).

Όγκος ψεκαστικού δ/τος: Για όλες τις καλλιέργειες του πεδίου εφαρμογής ο όγκος του ψεκαστικού δ/τος είναι: 20-40 λίτρα / στρέμμα.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/ καλλιεργητική περίοδος: Για όλες τις καλλιέργειες του πεδίου εφαρμογής ο μέγιστος αριθμός εφαρμογών/ καλλιεργητική περίοδος είναι: **1**

*** Ευαίσθητα ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια:** *Alopecurus myosuroides* (αλεπονουρά), *Digitaria sanguinalis* (αιματόχορτο), *Echinochloa crus-galli* (μουχρίτσα), *Panicum dichotomiflorum* (πάνικο διχοτομικό), *Setaria viridis* (σετάρια πράσινη), *Setaria verticillata* (σετάρια σπονδυλωτή), *Poa annua* (κοινή πόα).

*** Ευαίσθητα ετήσια πλατύφυλλα ζιζάνια:** *Amaranthus retroflexus* (τραχύ βλήτο), *Amaranthus blitoides* (πλαγιαστό βλήτο), *Anagallis arvensis* (αναγαλλίδα), *Capsella bursa-pastoris* (καψέλλα), *Cardamine hirsuta* (καρδαμίνια), *Chenopodium album* (λουβουδιά), *Euphorbia spp.* (γαλατσίδες), *Polygonum persicaria* (αγριοπιπεριά), *Polygonum aviculare* (πολυκούμπι), *Polygonum lapathifolium* (λαπάτσα), *Bilderdylgia convolvulus* (αναρχιχώμενο πολύγονο), *Portulaca oleracea* (αντράκλα), *Solanum nigrum* (αγριοτοματιά ή σούφνος), *Sonchus oleraceus* (ζωχός), *Stachys annua* (στάχυς), *Stellaria media* (στελλάρια), *Urtica urens* (μικρή τσουκνίδα), *Veronica hederifolia*, *Veronica persica* (βερόνικα), *Viola arvensis* (κοινός αγριοπανσός).

ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΙΣΩ ΣΕΛΙΔΑ

Παρατηρήσεις: Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων που προέρχονται από αμπελώνες στους οποίους έχει γίνει χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος MOST MICRO 365 CS. Προετοιμάστε καλή σποροκλίνη, επίπεδη, ψιλοχωματισμένη και αρκετά συμπαγή. Ποτίστε εάν δεν βρέξει μέσα σε 7-10 ημέρες από την εφαρμογή ώστε να ενσωματωθεί το φάρμακο στο επιφανειακό στρώμα του εδάφους. Σπείρετε τις καλλιέργειες σε ομοιόμορφο βάθος σποράς τουλάχιστον 3 εκ. για τα καρώτα και τα κρεμμύδια και 4 εκ. για τις υπόλοιπες καλλιέργειες, έτσι ώστε να μην ξεσκεπάζονται ή μένουν σπόροι στην επιφάνεια. Στις μεταφυτευμένες καλλιέργειες (τομάτα, πιπεριά και καπνό) εφαρμόστε το MOST MICRO 365 CS σε καλά ψιλοχωματισμένο έδαφος τουλάχιστον 7-8 ημέρες πριν την μεταφύτευση. Ενσωματώστε με ελαφρύ πότισμα το οποίο πρέπει να επαναληφθεί μετά την μεταφύτευση. Σε καμία περίπτωση μη κάνετε “γέμιση” (τράβηγμα χώματος στην ρίζα) πριν περάσουν τουλάχιστον 30 ημέρες από την εφαρμογή. Στις μεταφυτωτικές εφαρμογές, τα ζιζάνια θα πρέπει να είναι σε πολύ νεαρό στάδιο (φύτρωμα–κοτυληδόνες). Μετά την εφαρμογή, πλύνετε καλά το ψεκαστικό και όλα τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν. Σε περίπτωση που επιβάλλεται επανασπορά σε ψεκασμένο έδαφος, αποφύγετε την επαφή του νέου σπόρου με το φάρμακο, σπέρνοντας σε μεγαλύτερο βάθος, χωρίς την μετακίνηση του επιφανειακού εδάφους ή οργώνοντας σε βάθος τουλάχιστον 20 εκ. το οποίο είναι απαραίτητο εάν η αρχική καλλιέργεια αντικατασταθεί με ζαχαρότευτλο. Οι μικρότερες δόσεις αναφέρονται σε ελαφριά εδάφη - χαμηλής περιεκτικότητας σε οργανική ουσία και μικρούς πληθυσμούς ζιζανίων, ενώ οι μεγαλύτερες σε μέσης σύστασης ή βαριά εδάφη - μέσης έως υψηλής περιεκτικότητας σε οργανική ουσία ή/και μεγαλύτερους πληθυσμούς ζιζανίων. Προτεινόμενα είδη καλλωπιστικών φυτών: Τούγια (*Thuja occidentalis*), είδη *Prunus* sp., Κουπρεοσκύπαρις (*Cypressocyparis leylandii*), Βιβούρνο (*Viburnum* sp.), Κράταιγος (*Crataegus* sp.), Ήμερο πουνράρι (*Ilex* sp.), Πασχάλια (*Syringa vulgaris*), Μανόλια (*Magnolia grandiflora*), Δρυς (*Quercus* sp.), Φοίνικας (*Phoenix* sp.), Πεύκο (*Pinus* sp.), Λεύκα (*Populus alba*), Πλάτανος (*Platanus occidentalis*), Ιτιά κλαίουσα

(*Salix babylonica*), Καρυδιά (*Juglans nigra*), Ροδόδεντρο (*Rhododendron* sp.), Πυξός (*Buxus* sp.), Καμέλια (*Camelia japonica*), Γαρδένια (*Gardenia jasminoides*), Κυδωνίαστρο (*Cotoneaster* sp.), Κυπαρίσις (*Cupressus sempervirens*), Ευώνυμο (*Euonymus japonicus*), Πυράκανθα (*Pyracantha coccinea*), Φορσύθια (*Forsythia intermedia*), Ιβίσκος (*Hibiscus syriacus*), Άρκευθος (*Juniperus* sp.), Λεβάντα (*Lavandula angustifolia*), Αγγελική (*Pittosporum tobira*), Μυρτιά (*Myrtus communis*), Πικροδάφνη (*Nerium oleander*), Χαμαίριπας (*Chamaerops* sp.), Φωτίνια (*Photinia* sp.), Λιγούστρο (*Ligustrum* sp.), Δάφνη Απόλλωνος (*Laurus nobilis*), Γιούκα (*Yucca* sp.), Κισσός (*Hedera helix*), Πελαργόνιο (*Pelargonium* sp.), Γιασεμί (*Jasminum* sp.), Μυόπορο (*Myoporum parviflorum*), Σπαράγγι (*Asparagus officinalis*), Φρέζια (*Freesia* sp.), Λιλιουμ (*Lilium* sp.), Παιωνία (*Paeonia* sp.), Γλυτσίνια (*Wisteria* sp.), Αμμοφίλα sp.

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης της προστατευμένης καλλιέργειας: 1) Σόγια, βαμβάκι, μπιζέλι, σκόρδο, ηλιάνθος και μεταφυτευόμενες καλλιέργειες μπορούν να σπαρθούν/φυτευτούν οποτεδήποτε μετά την εφαρμογή του MOST MICRO 365 CS, αφού προηγηθεί βαθιά άροση (15-20 εκ). 2) Πατάτα μπορεί να φυτευτεί 3 μήνες μετά την εφαρμογή του MOST MICRO 365 CS αφού προηγηθεί βαθιά άροση (15-20 εκ).

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: 1) Άλλες καλλιέργειες μπορούν να σπαρθούν/φυτευτούν 6 μήνες μετά την εφαρμογή του MOST MICRO 365 CS αφού προηγηθεί βαθιά άροση (15-20 εκ). 2) Ζαχαρότευτλα μπορούν να σπαρθούν 10 μήνες μετά την εφαρμογή του MOST MICRO 365 CS αφού προηγηθεί βαθιά άροση (15-20 εκ).

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής. Το προϊόν είναι αποτελεσματικό και καταπολεμά τα ζιζάνια που φυτρώνουν ή βρίσκονται σε πολύ νεαρό στάδιο (φύτρωμα - κοτυληδόνες). Εφόσον υπάρχουν φυτρωμένα ζιζάνια θα πρέπει προηγουμένως να καταστραφούν με σκάλισμα ή βοτάνισμα ή με κατάλληλο μεταφυτωτικό ζιζανιοκτόνο. Η εκλεκτικότητα ως προς τις παραπάνω καλλιέργειες που σπέρνονται εξαρτάται άμεσα από την τήρηση των οδηγιών του χρόνου και του βάθους σποράς. Σε περίπτωση ανομοιόμορφης σποράς σε πολύ μικρό βάθος, η εκλεκτικότητα μπορεί να είναι περιορισμένη, ειδικά εάν ακολουθήσουν ισχυρές βροχοπτώσεις μετά την εφαρμογή. Οι μεταφυτευτικές εφαρμογές, πρέπει να γίνονται 7-8 ημέρες πριν την εγκατάσταση των φυτών, στα οποία δεν πρέπει να γίνει γέμιση (τράβηγμα χώματος στην ρίζα) πριν περάσει ένας μήνας. Στα κρεμμύδια, καρότα, καλαμπόκι και ηλιάνθο, χρησιμοποιήστε τις μικρότερες δόσεις στα ελαφρά εδάφη. Κατά τις εφαρμογές σε καλλωπιστικά φυτά, το σκεύασμα να μην έρχεται σε επαφή με το φύλλωμα ή τα μη καλά ξυλοποιημένα μέρη των φυτών. Το σκεύασμα μπορεί να είναι φυτοτοξικό στις καλλιέργειες που δεν αναφέρονται σε αυτή την ετικέτα.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Δεν ορίζεται λόγω πολύ ενωρίς χρόνου εφαρμογής.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται, στην αρχική του, κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό, και καλά αεριζόμενο.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: --

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός εδάφους προφυτωτικά ή μεταφυτωτικά. Χρησιμοποιείτε μπεκ τύπου σκούπας και ψεκάστε με πίεση ψεκαστικού μικρότερη από 3 – 4 ατμόσφαιρες (45-60 PSI).

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

Παρατηρήσεις: Το MOST MICRO 365 CS είναι ασφαλές κατά την εφαρμογή του γύρω και κάτω από πολλά είδη καλλωπιστικών (φυτά, θάμνοι, δέντρα). Ωστόσο δεν έχει διερευνηθεί η εκλεκτικότητά του σε όλες τις ποικιλίες και τα υβρίδια. Ανεπιθύμητες επιπτώσεις, όπως η φυτοτοξικότητα, μπορεί να προκύψει εξαιτίας διαφόρων περιβαλλοντικών συνθηκών, συνθηκών ανάπτυξης ή από τον τρόπο εφαρμογής του ζιζανιοκτόνου. Επομένως, συστήνεται, πριν τη γενικευμένη χρήση του, η δοκιμή σε ένα μικρό αριθμό φυτών και η εξέτασή τους 1-2 μήνες μετά για πιθανή φυτοτοξικότητα. Μην κάνετε καθολικούς ψεκασμούς σε φυτώρια ή σε φυτά προς μεταφύτευση. Μην εφαρμόζετε το MOST MICRO 365 CS σε καλλωπιστικά φυτά που έχουν εμβολιαστεί ή είναι σε έντονη βλαστητική ανάπτυξη ή κατά την ανθοφορία. Μην εφαρμόζετε το MOST MICRO 365 CS σε φυτά κατά την έναρξη της ανθοφορίας ή την πρώτη βλαστητική ανάπτυξη. Μην επιτρέψετε τα σταγονίδια του ψεκαστικού υγρού να πέσουν πάνω στο φύλλωμα, τους οφθαλμούς ή τα άνθη. Φροντίστε ώστε το έδαφος να μην έχει σκασίματα ή ρωγμές που ενδεχόμενα θα επιτρέψουν την επαφή του MOST MICRO 365 CS με το ριζικό σύστημα των καλλωπιστικών φυτών. Όταν το ριζικό σύστημα έχει εγκατασταθεί καλά, κάνετε την εφαρμογή του MOST MICRO 365 CS πριν τον εμβολιασμό ή την άνθιση των φυτών. Σε περίπτωση που κάποια είδη καλλωπιστικών παρουσιάζουν φυτοτοξικότητα, μην τα φυτέψετε σε έδαφος στο οποίο έχει εφαρμοστεί MOST MICRO 365 CS κατά την προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο. Για φυτά που μεταφυτεύονται γυμνόριζα, μην εφαρμόζετε το MOST MICRO 365 CS πριν περάσουν 2-4 εβδομάδες από τη μεταφύτευση στην οριστική τους θέση.