

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν μολυνθεί. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. «Αποφύγετε την ελευθέρωση του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/ δελτίο δεδομένων ασφαλείας».

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για 5 λεπτά τουλάχιστον και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: πλύνετε αμέσως καλά με άφθονο νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση εισπνοής: μετακινήστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Συμβουλευτείτε γιατρό.

Μην χορηγήσετε τίποτα στον παθόντα και μη προκαλέσετε εμετό σε περίπτωση που δεν έχει τις αισθήσεις του ή έχει σπασμούς.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Ειδικό αντίδοτο δεν υπάρχει. Ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 7793777

«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης».

«Μη ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του».

«Για να προστατέψετε μη στοχευόμενα φυτά να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας **10 μέτρων** μέχρι μη γεωργική γη για τους οπωρώνες και **5 μέτρα** για τα αμπέλια και τα λαχανικά αγρού».

«Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας **10 μέτρων** μέχρι τα σώματα των επιφανειακών υδάτων για τους οπωρώνες.

Προκειμένου να μην αναπτυχθεί ανθεκτικότητα μην χρησιμοποιείται αυτό ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν που περιέχει διακυλιδραζίνες περισσότερες από 2 με 3 φορές ανά καλλιεργητική περίοδο.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Το φυτοπροστατευτικό προϊόν ONORE 240 SC μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε προγράμματα IPM (Integrated Pest management).

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Για την ίδια καλλιεργητική περίοδο σε μια καλλιέργεια το ONORE πρέπει να χρησιμοποιείται σε εναλλαγή με εντομοκτόνα από ομάδες με διαφορετικό τρόπο δράσης. Αποφύγετε την διαδοχική χρήση του ONORE σε καλλιέργειες που έχει ήδη γίνει εφαρμογή με σκευάσματα που περιέχουν Ιεβουφενζολίδη (MIMIC). Χρησιμοποιείστε όλες τις δυνατές καλλιεργητικές τεχνικές καθώς και φυσικές και βιολογικές μεθόδους για τον έλεγχο των εχθρών (παρακολούθηση των πτήσεων των ενηλικών και προστασία των ωφελίμων αρθροπόδων) έτσι ώστε να μειωθεί η ασκούμενη πίεση επιλογής για ανθεκτικότητα, από τις εφαρμογές εντομοκτόνων. Αποφύγετε την εφαρμογή του ONORE σε περισσότερες από 2 με 3 συνεχόμενες γενιές των εχθρών στόχων κατ' έτος. Αποφύγετε την χρήση εντομοκτόνων της ομάδας των διακυλιδραζινών για την εξάλειψη εκτεταμένης μη ελεγχόμενης προσβολής.

Συνδυαστικότητα: Δεν υπάρχουν στοιχεία

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενος με σχίσμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια στην αρχική απараβιαστη συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο.

Ημ/νία παρασκευής / Αρ. παρτίδας: βλέπε φιάλη

Dow Dow AgroSciences



Methoxyfenozide Εγγυημένη σύνθεση: methoxyfenozide: 24% β/ο (μεθοξυφενοζάντη) βοηθητικές ουσίες: 76.83% β/β

Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

Εντομοκτόνο επαφής και στομάχου

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ



Επικίνδυνο για το περιβάλλον

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Κάτοχος της έγκρισης: Dow AgroSciences European Dev. Center, 3 Milton Park Abingdon, OX14 4RN, Ηνωμένο Βασίλειο

Εργοστάσιο συσκευασίας σκευάσματος: K&N, ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ

ΒΙ.Π.Ε. Σίνδου - Θεσσαλονίκη

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΜΑΣ ΑΕΒΕ

Α.Μεσογειών 335, Χαλάνδρι, Τηλ: 2106726381, Αθήνα.



***Trademark of the Dow Chemical company ("Dow") or an affiliated company of Dow

Αρ.Εγκρ.Κυκλ: 14357/ 1-3-2011

Περιεχόμενο 1 λίτρο

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Το ONORE 240 SC είναι εντομοκτόνο επαφής και στομάχου της ομάδας των διακυλιδραζινών. Καταπολεμά τις προνύμφες των λεπιδοπτερών σε εσπεριδοειδή (πορτοκάλια, μανταρίνια), μηλοειδή (μήλα, αχλάδια), πυρηνόκαρπα (βερίκοκα, ροδάκινα, νεκταρίνια), αμπέλι, τομάτες και πιπεριές θερμοκηπίου. Το methoxyfenozide είναι **ροθμιστής της ανάπτυξης των εντόμων** και δρά ως μιμητικό της ορμόνης έκδυσης της εκδύσσης, στις προνύμφες των λεπιδοπτερών. Λόγω της δέσμευσης του methoxyfenozide στη θέση - δέκτη της εκδύσσης, προκαλείται πρόωμη και ατελής έκδυση, με αποτέλεσμα το θάνατο του εντόμου.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ (Πεδίο εφαρμογής, Στόχος, Δόσεις, Όγκος ψεκαστικού δ/τος, Τρόπος και χρόνος εφαρμογής, Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/ καλλιεργητική περίοδο):

Εσπεριδοειδή (Πορτοκάλια, Μανταρίνια): Κατά του **Φυλλοκνίστη (Phyllocnistis citrella)**. Δόση 40 κ.εκ /100 λίτρα ψεκ. υγρού (max 80 κ.εκ/στρέμμα). Όγκος ψεκ. υγρού 200 λίτρα / στρέμμα. Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, στοχεύοντας στους νεοεκπτυσσόμενους βλαστούς. Μίγμα με θειικό πολτό σε δόση 300-500 ml/l. Μεσοδιάστημα εφαρμογής 10 ημέρες. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλ/κή περίοδο: 2

Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλάδια): Κατά των **Καρπόκαφα (Carposcapa Pomonella)**, **Φυλλοδέκτη (Adoxophyes orana)**, **Φυλλορρυκτών (Lithocolletis sp./Δευτερευίσια δράση)**. Δόση 40 κ.εκ /100 λίτρα ψεκ. υγρού (max 72 κ.εκ/στρέμμα). Όγκος ψεκ. υγρού 100-180 λίτρα / στρέμμα. Πρώτη εφαρμογή κατά την έναρξη της εναπόθεσης των ωών (περίπου 7 ημέρες από την έναρξη της σύλληψης των ακμαίων στις φερομονικές παγίδες) και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Μεσοδιάστημα εφαρμογής 14 -21 ημέρες. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλ/κή περίοδο: 3

Πυρηνόκαρπα (Ροδάκινα, νεκταρίνια, βερικοκιά): Κατά του **Φυλλοδέκτη (Adoxophyes orana)**. Δόση 40 κ.εκ /100 λίτρα ψεκ. υγρού (max 72 κ.εκ/στρέμμα). Όγκος ψεκ. υγρού 150-180 λίτρα / στρέμμα. Πρώτη εφαρμογή κατά την έναρξη της εναπόθεσης των ωών (περίπου 7 ημέρες από την έναρξη της σύλληψης των ακμαίων στις φερομονικές παγίδες) και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Μεσοδιάστημα εφαρμογής 14 -21 ημέρες. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλ/κή περίοδο: 3

Αμπέλι (Ποικιλίες επιτραπέζιες, οινοποιήσιμες και σταφίδες): Κατά της **Ευδεμίδας (Lobesia botrana syn Polychrosis botrana)**. Δόση 40 κ.εκ /100 λίτρα ψεκ. υγρού (max 50 κ.εκ/στρέμμα). Όγκος ψεκ. υγρού 100-125 λίτρα / στρέμμα. Πρώτη εφαρμογή κατά την έναρξη της εναπόθεσης των ωών (περίπου 7 ημέρες από την έναρξη της σύλληψης των ακμαίων στις φερομονικές παγίδες) και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Μεσοδιάστημα εφαρμογής 14 -21 ημέρες. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλ/κή περίοδο: 4

Τομάτα, Πιπεριά (Θερμοκηπίου): Κατά της **Σποντόπτερας (Spodoptera sp)**. Δόση 40 κ.εκ /100 λίτρα ψεκ. υγρού (max 60 κ.εκ/στρέμμα). Όγκος ψεκ. υγρού 100-150 λίτρα / στρέμμα. Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής. Μεσοδιάστημα εφαρμογής 14 -21 ημέρες. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλ/κή περίοδο: 3

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος. Ο όγκος του ψεκαστικού υγρού πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να γίνει καλή διαβροχή του φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζετε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Διαλύετε το φάρμακο σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνετε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας καλά. Προσθέτετε το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας πάντα καλά.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας: Το ONORE 240 SC δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Μηλιά, αχλάδια, πορτοκάλια, μανταρίνια: 14 ημέρες

Βερικοκιά, Ροδάκινα (συμπεριλαμβανομένης της νεκταρινιάς) : 7 ημέρες

Τομάτα, πιπεριά: 1 ημέρα

Αμπέλια οινοποιήσιμα: 14 ημέρες

Αμπέλια επιτραπέζια, σταφίδες: 7 ημέρες

