

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο: Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. Μην προκαλέσετε εμετό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε άμεσα με μεγάλες ποσότητες νερού για 15 λεπτά κρατώντας ανοικτά τα βλέφαρα και συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Να αποφεύγεται παρατεταμένη ή συχνά επαναλαμβανόμενη επαφή με το δέρμα, διότι μπορεί να προκληθεί ερεθισμός. Εάν το προϊόν πέσει με μεγάλη πίεση στο δέρμα, μπορεί να εισαχθούν μέσα στους ιστούς. Στην περίπτωση αυτή να ζητηθεί ιατρική εξέταση ακόμη και εάν δεν υπάρχουν εμφανή συμπτώματα. Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον ασθενή σε καθαρό αέρα, κρατήστε τον ζεστό και σε ανάπαυση. Μπορεί να προκληθεί ερεθισμός του στόματος και της αναπνευστικής οδού.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσης.

Μη ρυπαίνετε τα νερά ύδρευσης ή άρδευσης με το φάρμακο ή τα κενά σκευασμάς του.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος με ψεκαστήρες κοινού όγκου (5-6 atm) ή μηχανοκίνητους (25-30 atm) και μικέ τύπου σκούπας.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Αραιώνουμε το φάρμακο σε μικρή ποσότητα νερού ανακατεύοντας μέχρι να γίνει ομοιομορφο γαλακτώμα και το ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση μέχρι το τέλος του ψεκασμού. Σε περίπτωση που πρέπει να προστεθούν άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, αυτό γίνεται αφού πρώτα το γαλακτώμα του ορυκτελαίου αναδεύεται καλά. Σε περίπτωση που το αναμείξουμε με βρέξιμη σκόνη, ετοιμάζουμε πρώτα το αραιωμένο γαλακτώμα ορυκτελαίου και μετά προσθέτουμε την ήδη διαλυμένη σε νερό βρέξιμη σκόνη.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα κενά δοχεία σκευασμάτων ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενος με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, ενσωματώνεται όλο σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΣΥΝΔΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν συνδυάζεται με ισχυρά αλκαλικά σκευάσματα, θείο, captan.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συνιστώμενες δόσεις και οδηγίες. Να χρησιμοποιούνται οι μικρές δόσεις σε ευαίσθητα στο λάδι φυτά (π.χ. σε μικρά καλλωπιστικά). Να γίνεται δοκιμή σε 1 ή 2 φυτά.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Αμπελί, ακτινίδια: ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ (εφαρμογή στο στάδιο του λήθαργου). Λοιπές καλλιέργειες: 21 ημέρες. Σε περίπτωση αναμίξεως με άλλο σκεύασμα οφειλούμε να τηρούμε την “τελευταία επέμβαση” του άλλου σκευάσματος (αν αυτή είναι πάνω από 21 ημέρες).

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΒΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Διατηρείται στην αρχική του απαράβιαστη συσκευασία, σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο περιβάλλον. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

SIPCAM S.p.A.

RUBINOL 7E EC

paraffin oil 96,3 % (παραφινικό λάδι)
Υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC)

Εγγυημένη σύνθεση: paraffin oil 96,3% 8/8
Βοηθητικές ουσίες: 3,7% 8/8

Θερινός πολτός, κατά κοκκοειδών, ακάρεων, αφίδων και λεπιδοπτέρων.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ



KINΔYNOΣ

Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Περιεχόμενο: 1 λίτρο

Αρ. Εγκρ.Κυκλ.: 14209/ 28.01.2008
Κάτοχος της έγκρισης: SIPCAM SpA
Via Sempione 195 - 20016 Pero (MI), Italia
Υπεύθυνος επικοινωνίας και διάθεσης στην αγορά:
ΣΙΠΚΑΜ ΕΛΛΑΣ Μ. ΕΠΕ.
Ήρας 3, 19400-ΚΟΡΟΠΙ
Τηλ.: 210 52 23 834



Διανομέας:
ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
Λ. Μεσογείων 335
153 10 Χαλάνδρι, Αθήνα
Τηλ.: 210 6726381

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Θερινός πολτός, κατά κοκκοειδών, ακάρεων, αφίδων και λεπιδοπτέρων.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: ΑΜΠΕΛΙ, ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ: Για την καταπολέμηση των χειμερινών αυγών του Κόκκινου τετράνυχου (Panonychus ulmi). Δόση 1000 κ.εκ. σκ./ 100 λίτ. Ψεκ. υγρού (max. 500 κ.εκ./ στρέμμα). Όγκος ψεκ. Υγρού 50 λίτρα/στρ. Εφαρμογή το τέλος χειμώνα με αρχές άνοιξης, τουλάχιστον 10 ημέρες μετά το κλάδεμα και πριν την έναρξη διάγκωσης των οφθαλμών. **Μεγ. Αρ. ανά καλ. περίοδο: 1**

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Γκρέπ φρούτ, λεμονιά, μανταρινιά, πορτοκαλιά, φράπα): Για την καταπολέμηση των: Κόκκινη ψάρα (Aonidiella aurantii), Ψευδοκόκκος (Pseudococcus citri), Λεκάδιο (Saissetia oleae), Ασπίδα ψάρας (Aspidiotus nerii), Μαύρη ψάρα (Parlatoria zizyphi), Άλλα κοκκοειδή (Chrysomphalus dictyospermi), Ρενίβια purchasi, Ceroplastes rusci, C. sinensis, Mytillococcus becki, Coccus hesperidum), Τετράνυχου (Panonychus citri, Tetranychus urticae, Eriophyes sheldoni, Aculus pelecassi), Αλευρώδεις (Dialeurodes citri, Aleurothrips floccosus). Δόση 1000-1300 κ.εκ. σκ./ 100 λίτ. Ψεκ. υγρού Ή 500 κ.εκ./100 λίτ σε συνδυασμό με την εγκεκριμένη δόση ενός εντομοκτόνου ή ακαρεοκτόνου. (max. 5200 κ.εκ. σκ./ στρέμμα ή 2000 σε συνδυασμό με την εγκεκριμένη δόση ενός εντομοκτόνου ή ακαρεοκτόνου). Όγκος ψεκ. Υγρού 200-400 λίτρα/στρ. Μπορεί να εφαρμοσθεί καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Συνιστώνται ψεκασμοί: -Άνοιξης (με την έναρξη της βλάστησης). -Καλοκαιριού. -Φθινοπώρου. -Χειμώνα. Η καλύτερη εποχή είναι αρχές Ιουνίου με τέλος Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση έντονης προσβολής μπορεί να γίνει ψεκασμός στο χειμώνα (Φεβρουάριο- Μάρτιο). **Μεγ. Αρ. ανά καλ. περίοδο: 4**

ΜΗΛΟΕΙΔΗ Μηλιά, αχλαδιά: Για την καταπολέμηση των: Ψάρα Σαν-Ζοζέ (Quadraspidiotus perniciosus), Παρλατόρια (Parlatoria oleae), Βαμβακάδα (Pseudalacaspis pentagona), Μυτλάμορφη ψάρα (Lepidosaphes ulmi), Σταχτιά ψάρα (Epidiaspis lerep), Φυλλοδέτεις (Archips rosana, A. rodanus), Τετράνυχου (Tetranychus urticae, Panonychus ulmi, Bryobia rubiotulculus), Ψύλλα (Psylla spp), Αφίδες (Eriosoma lanigerum, Aphis pomi, Dysaphis piri, D. plantaginea). Δόση 1000-1300 κ.εκ. σκ./ 100 λίτ. Ψεκ. υγρού Ή 500 κ.εκ./100 λίτ σε συνδυασμό με την εγκεκριμένη δόση ενός εντομοκτόνου ή ακαρεοκτόνου. (max. 3250 κ.εκ. σκ./ στρέμμα ή 1250 σε συνδυασμό με την εγκεκριμένη δόση ενός εντομοκτόνου ή ακαρεοκτόνου). Όγκος ψεκ. Υγρού 150-250 λίτρα/στρ. Μπορεί να εφαρμοσθεί καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Συνιστώνται ψεκασμοί: -Άνοιξης (με την έναρξη της βλάστησης). -Καλοκαιριού. -Φθινοπώρου. -Χειμώνα. **Μεγ. Αρ. ανά καλ. περίοδο: 4**

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Βερικοκιά, κερασιά, ροδακινιά, δαμασκηνιά): Για την καταπολέμηση των: Ψάρα Σαν Ζοζέ (Quadraspidiotus perniciosus), Βαμβακάδα (Pseudalacaspis pentagona), Σφαερολέκανιο (Sphaerolecanium prunastri), Παρλατόρια (Parlatoria oleae), Μυτλάμορφη ψάρα (Lepidosaphes ulmi), Αφίδες (Myzus persicae, Aphis spp.), Φυλλοδέτεις (Archips rosanus, rodanus), Ακάρεα (Tetranychus spp., Bryobia praeliosa, Aculus spp), Προνύμφες αφίδων και άλλων εντόμων. Δόση 1000-1300 κ.εκ. σκ./ 100 λίτ. Ψεκ. υγρού Ή 500 κ.εκ./100 λίτ σε συνδυασμό με την εγκεκριμένη δόση ενός εντομοκτόνου ή ακαρεοκτόνου. (max. 3250 κ.εκ. σκ./ στρέμμα ή 1250 σε συνδυασμό με την εγκεκριμένη δόση ενός εντομοκτόνου ή ακαρεοκτόνου). Όγκος ψεκ. Υγρού 150-250 λίτρα/στρ. Μπορεί να εφαρμοσθεί καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Συνιστώνται ψεκασμοί: -Άνοιξης (με την έναρξη της βλάστησης). -Καλοκαιριού. -Φθινοπώρου. -Χειμώνα. **Μεγ. Αρ. ανά καλ. περίοδο: 4**

ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ: Για την καταπολέμηση των: Ψάρα Σαν Ζοζέ (Quadraspidiotus perniciosus), Βαμβακάδα (Pseudalacaspis pentagona), Σφαερολέκανιο (Sphaerolecanium prunastri), Παρλατόρια (Parlatoria oleae), Μυτλάμορφη ψάρα (Lepidosaphes ulmi), Αφίδες (Myzus persicae, Aphis spp.), Φυλλοδέτεις (Archips rosanus, rodanus), Ακάρεα (Tetranychus spp., Bryobia praeliosa, Aculus spp), Προνύμφες αφίδων και άλλων εντόμων. Δόση 1000-1300 κ.εκ. σκ./ 100 λίτ. Ψεκ. υγρού Ή 500 κ.εκ./100 λίτ σε συνδυασμό με την εγκεκριμένη δόση ενός εντομοκτόνου ή ακαρεοκτόνου. (max. 2600 κ.εκ. σκ./ στρέμμα ή 1000 σε συνδυασμό με την εγκεκριμένη δόση ενός εντομοκτόνου ή ακαρεοκτόνου). Όγκος ψεκ. Υγρού 100-200 λίτρα/στρ. Μπορεί να εφαρμοσθεί καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Συνιστώνται ψεκασμοί: -Άνοιξης (με την έναρξη της βλάστησης). -Καλοκαιριού. -Φθινοπώρου. -Χειμώνα. **Μεγ. Αρ. ανά καλ. περίοδο: 4**

ΕΛΙΑ: Για την καταπολέμηση των: Λεκάδιο (Saissetia oleae), Ασπιδιώδεις (Aspidiotus nerii), Παρλατόρια (Parlatoria oleae), Πολίνια (Pollinia pollini), Μυτλάμορφη ψάρα (Lepidosaphes ulmi), Βαμβακάδα (Euphyllia olivina), Προνύμφες εντόμων. Δόση 1000-1300 κ.εκ. σκ./ 100 λίτ. Ψεκ. υγρού Ή 500 κ.εκ./100 λίτ σε συνδυασμό με την εγκεκριμένη δόση ενός εντομοκτόνου ή ακαρεοκτόνου. (max. 3900 κ.εκ. σκ./ στρέμμα ή 1500 σε συνδυασμό με την εγκεκριμένη δόση ενός εντομοκτόνου ή ακαρεοκτόνου). Όγκος ψεκ. Υγρού 80 λίτρα/στρ. Μπορεί να εφαρμοσθεί καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Συνιστώνται ψεκασμοί: -Άνοιξης (με την έναρξη της βλάστησης). -Καλοκαιριού. -Φθινοπώρου. -Χειμώνα. **Μεγ. Αρ. ανά καλ. περίοδο: 4**

ΚΑΛΑΠΟΤΙΣΤΙΚΑ: Για την καταπολέμηση των: Κοκκοειδή (Parlatoria spp., Aspidiotus spp., Diaspis spp., Saissetia oleae, Icerya purchasi, Ceroplastes sinensis, Pseudococcus spp.), Φυλλορύκτες (Nartpicula centifoliella, Hyponomeuta malinellus, Leucocoptera spp.), Φυλλοδέτεις (Tortix spp.), Αφίδες (Aphis spp.). Δόση 1000-1300 κ.εκ. σκ./ 100 λίτ. Ψεκ. υγρού Ή 500 κ.εκ./100 λίτ σε συνδυασμό με την εγκεκριμένη δόση ενός εντομοκτόνου ή ακαρεοκτόνου. (max. 1040 κ.εκ. σκ./ στρέμμα ή 400 σε συνδυασμό με την εγκεκριμένη δόση ενός εντομοκτόνου ή ακαρεοκτόνου). Όγκος ψεκ. Υγρού 80 λίτρα/στρ. Μπορεί να εφαρμοσθεί καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Συνιστώνται ψεκασμοί: -Άνοιξης (με την έναρξη της βλάστησης). -Καλοκαιριού. -Φθινοπώρου. -Χειμώνα. **Μεγ. Αρ. ανά καλ. περίοδο: 4**

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Το εύρος των δόσεων εξαρτάται από τη ένταση της προσβολής.
2. Κατά τη χρήση του RUBINOL 7E τα δένδρα πρέπει να είναι ποτισμένα. Ποτίζουμε μία εβδομάδα πριν από τον ψεκασμό.
3. Αποφεύγετε τον ψεκασμό όταν τα φυτά είναι υπερμαρμένα και σε περιόδους έντονης Ήρασις.
4. Να μη γίνεται εφαρμογή με το σκεύασμα όταν η θερμοκρασία ξεπερνάει τους 32° C, γιατί μπορεί να εμφανιστούν προβλήματα φυτοτοξικότητας.
5. Να μην γίνονται ψεκασμοί όταν υπάρχει παγετός ή κίνδυνος παγετού, καθώς και σε περιόδους Ήρασις και υπερβολικής υγρασίας.
6. Να μην γίνεται εφαρμογή με το σκεύασμα επί 30 ημέρες πριν ή μετά την εφαρμογή βείου ή θειοβαστίου.
7. Στα μηλοειδή και ειδικά στο κυστάλλι να μην προηγείται ή έπεται εφαρμογή captan, folpet, δικητροενώσεων σε διάστημα τουλάχιστον 1 εβδομάδας.